

# Kümeler kuramı

David Pierce

6 Mayıs 2013, saat 16:14

Matematik Bölümü  
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  
İstanbul  
dpierce@msgsu.edu.tr  
<http://mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/>

Bu eser  
Creative Commons Attribution–Gayriticari–Share-Alike  
3.0 Unported Lisansı ile lisanslıdır.  
Lisansın bir kopyasını görebilmek için,  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.tr>  
adresini ziyaret edin ya da aşağıdaki adrese yazın:  
Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,  
Mountain View, California, 94041, USA.

© BY David Austin Pierce ©

Bu notları, MAT 340 kodlu Aksiyomatik Kümeler Kuramı dersi için  
yazıyorum. Lütfen hataları bana bildirin.

# İçindekiler

<b>1 Giriş</b>	<b>1</b>
1.1 Sayma ve ordinarler . . . . .	1
1.2 Ordinarler Hesapları . . . . .	5
1.3 Kümeler ve Sınıflar . . . . .	7
1.4 Kardinaler . . . . .	9
<b>2 Mantık</b>	<b>15</b>
2.1 Formüller . . . . .	15
2.2 Doğruluk ve Yanlışlık . . . . .	17
2.3 Eşitlik . . . . .	20
2.4 Sınıflar . . . . .	23
2.5 İşlemler . . . . .	25
<b>3 Doğal Sayılar</b>	<b>28</b>
3.1 Doğal sayılar kümesi . . . . .	28
3.2 Bağıntılar . . . . .	33
3.3 Sıralamalar . . . . .	36
3.4 Ordinarler . . . . .	38
3.5 Özyineleme . . . . .	40
<b>4 Ordinarler</b>	<b>44</b>
4.1 Özyineleme . . . . .	44
4.2 Toplama . . . . .	48
4.3 Çarpma . . . . .	52
4.4 Kuvvet alma . . . . .	55
4.5 Cantor normal biçimi . . . . .	59
<b>5 Kardinaler</b>	<b>63</b>
5.1 Eşleniklik . . . . .	63
5.2 Sonlu kümeler . . . . .	66

5.3	Sayılabilme . . . . .	67
5.3.1	Toplama . . . . .	69
5.3.2	Çarpma . . . . .	70
5.3.3	Kuvvet alma . . . . .	71
5.4	Büyüklik . . . . .	72
5.5	Sayılamaz sonsuzluk . . . . .	74
5.6	Toplama ve çarpma . . . . .	77
5.7	Ordinaller Kuvvetlerinin kardinalleri . . . . .	78
5.8	Kontinü Hipotezi . . . . .	79
5.9	Kardinaller kuvvetleri . . . . .	82
5.9.1	Kofinallık . . . . .	84
5.9.2	Hesapmalar . . . . .	87
	<b>Kaynakça</b>	<b>89</b>
	<b>İşaretler</b>	<b>92</b>
	<b>Dizin</b>	<b>94</b>

# 1 Giriş

## 1.1 Sayma ve ordinarler

Bir torbada birkaç tane satranç taşımız var, onları teker teker çekiyoruz, ve aynı zamanda sayılar diyoruz:

- (1) piyade (*pawn*); (2) kale (*rook*); (3) at (*knight*);  
(4) fil (*bishop*); (5) vezir (*queen*); (6) şah (*king*).

Bu şekilde taşları *saymış olduk*. Sonuç olarak 6 tane taşımız var deriz.

Ama taşları belli bir *sırada* çektik. Başka bir sıra mümkündü. Taşları tekrar çantaya koyup çekiyoruz:

- (1) piyade; (2) at; (3) vezir; (4) kale; (5) fil; (6) şah.

Son taşı çekince yine 6 numarasını diyoruz. Her zaman öyle olacak: her zaman taşları sayınca 6'ya kadar sayacağız. Ama nasıl biliyoruz?

Saymak nedir? Saymanın nesnesi, bir **topluluktur** (*collection*).<sup>\*</sup> Bir topluluğu sayınca aslında onu **sıralıyoruz** (*order*).

$A$  bir topluluk olsun, ve  $R$ , onun bir **sıralaması** (*ordering*) olsun. O zaman  $A$  topluluğunun **elemanları** (*elements*) veya **öğeleri** (*members*) vardır; ve bu topluluğun tüm  $b$ ,  $c$ , ve  $d$  elemanları için

1)  $b R b$  değil, yani

$$\neg b R b;$$

2)  $b R c$  ve  $c R d$  ise  $b R d$ , yani

$$b R c \wedge c R d \Rightarrow b R d;$$

3)  $b$  ve  $c$  birbirinden farklıysa ya  $b R c$  ya da  $c R b$ , yani

$$b = c \vee b R c \vee c R b.$$

---

<sup>\*</sup>**Kümeler** (*sets*), özel topluluk olacak.

Böylece  $R$ ,

- (1) **yansımaz** veya **dönüştür** (*irreflexive*),\*
- (2) **geçişli** veya **geçişken** (*transitive*),<sup>†</sup> ve
- (3) **doğrusal** (*linear*) veya **tam** (*total*)

bir bağıntıdır. O zaman  $(A, R)$  ikilisi (aslında *sıralı* ikilisi), bir **sıradır**. Bu sıra,  $A$  topluluğunun bir sırasdır.

Şimdi  $A$ , satranç taşları torbamız olsun. O zaman  $A$  topluluğunun tüm sıraları, birbiriyle **izomorftur** (*isomorphic*). Yani  $R$  ile  $S$ ,  $A$  topluluğunun iki sıralamasıysa, o zaman  $A$  topluluğundan kendisine giden öyle bir birebir ve örten  $f$  göndermesi vardır—yani  $A$  topluluğunun öyle bir  $f$  **permütasyonu** (*permutation*) veya **eşleşmesi** vardır—ki  $A$  topluluğunun tüm  $b$  ile  $c$  elemanları için

$$b R c \Leftrightarrow f(b) S f(c)$$

denkliği doğrudur. Ama bunu nasıl biliyoruz?

Şimdi  $A$ , pozitif *tamsayılar* topluluğu olsun. Yani  $A = \mathbb{N}$  olsun. Bu topluluğun alışılmış “doğal”  $<$  sıralaması vardır. Ama başka sıralamaları da vardır. Mesela  $\mathbb{N}$  topluluğunun öyle bir  $R$  **bağıntısı** (veya **ilişkisi**: *relation*) vardır ki topluluğun tüm  $k$  ile  $m$  elemanları için

$$k R m \Leftrightarrow 1 < k < m \vee 1 = m < k$$

denkliği doğrudur. Öyleyse  $R$  bağıntısı,  $\mathbb{N}$  topluluğunu sıralıyor; aslında  $R$  sıralaması,  $<$  sırası ile hemen hemen aynıdır, ancak  $R$  sırasına göre 1 elemanı,  $\mathbb{N}$  topluluğunun *son* elemanıdır. O zaman  $(\mathbb{N}, <)$  ile  $(\mathbb{N}, R)$ , birbirine izomorf değildir:

$$\begin{array}{c|cccc} < & 1, & 2, & 3, & \dots; & ? \\ \hline R & 2, & 3, & 4, & \dots; & 1 \end{array}$$

Şimdi

$$k S m \Leftrightarrow (2 \mid k + m \wedge k < m) \vee (2 \nmid k \wedge 2 \mid m)$$

olsun. O zaman  $k S m$  ancak ve ancak

\*Işık, bir ayından yansır; ses, bir kayalıktan yansır. *Yıkanmak* fiili, *kendi kendini yıkamak* öbeğinin anlamına gelirse, dönüşlüdür; *yıkanılma* fiilinin anlamına gelirse, edilgendir [14, 19].

<sup>†</sup>*Kaynatmak* fiili geçişlidir, çünkü bir nesne ister; *kaynamak* geçişsizdir.

- 1) hem  $k$  hem  $m$  ya tek ya çift, ve  $k < m$ , veya
- 2)  $k$  tek ve  $m$  çift.

O zaman  $S$  bağıntısı da,  $\mathbb{N}$  topluluğunu sıralıyor, ama  $(\mathbb{N}, <)$  ile  $(\mathbb{N}, S)$  sıraları, birbirine izomorf değildir:

$$\begin{array}{c|cccccccc} < & 1, & 2, & 3, & \dots; & ? & ? & ? & \dots \\ \hline S & 1, & 3, & 5, & \dots; & 2, & 4, & 6, & \dots \end{array}$$

$\mathbb{N}$  topluluğu sayılabilir mi? Normalde, sayarken, sayılar diyoruz.  $R$  sıralamasına göre  $\mathbb{N}$  topluluğunu sayınca 1 için hangi sayıyı diyebiliriz? Yani yukarıdaki ilk tablonun alt satırındaki 1 numarasının üstünde, soru işaretinin yerine hangi sayıyı koyabiliriz? Bu sayı  $\omega + 1$  olacak. Ondan sonra  $\omega + 2$ ,  $\omega + 3$ , vesaire sayıları olacak; bunlardan sonra,  $\omega + \omega$ , yani  $\omega \cdot 2$ ,  $\omega \cdot 2 + 1$ , vesaire sayıları olacak. Ama  $\mathbb{N}$  topluluğunun sadece  $\omega$  tane elemanı olacak.

Aslında kümeler kuramcılarını olarak sayarken, 0'dan başlayacağız:

$$\begin{array}{c|cccccccc} & 0, & 1, & 2, & \dots; & \omega, & \omega + 1, & \omega + 2, & \dots \\ \hline S & 1, & 3, & 5, & \dots; & 2, & 4, & 6, & \dots \end{array}$$

Burada 0, 1, 2, 3,  $\dots$ ;  $\omega$ ,  $\omega + 1$ ,  $\omega + 2$ ,  $\dots$ ;  $\omega \cdot 2$ ,  $\omega \cdot 2 + 1$ ,  $\dots$  numaraları, **ordinal sayılar** veya **ordinallerdir**. (Her ordinal, bu sırada bulunacak.) Ayrıca 0, 1, 2, 3,  $\dots$ ,  $\omega$  numaraları, **kardinal** (*cardinal*) **sayılar** veya **kardinaldirler** (başka kardinaler olacak); ama  $\omega + 1$ , bir kardinal değildir.

Her kardinal, bir ordinal olacak, ama her ordinal, bir kardinal olmayacak.

Her ordinal, bir **küme** olacak; ama bazı kümeler, ordinal olmayacak.

Her **küme**, bir topluluk olacak; ve her kümenin her elemanı, bir küme olacak. O zaman  $a$  ile  $b$  kümeysen, ya  $a$  kümesi,  $b$  kümesinin elemanıdır, ya da elemanı değildir. İlk durumda  $b$  kümesi,  $a$  kümesini **içerir** (*contains*), yani  $a$  kümesi,  $b$  kümesi tarafından **içerilir**, ve

$$a \in b$$

ifadesini yazarız;\* ikinci durumda  $b$  kümesi,  $a$  kümesini **içermez**, ve

$$a \notin b$$

ifadesini yazarız. Genelde  $C$  bir topluluk ise, ya  $a \in C$  ya da  $a \notin C$ .

Bize göre **boş bir topluluk**—elemanları olmayan bir topluluk—vardır, ve bu topluluk, bir kümedir. Bu varsayım, **Boş Küme Aksiyomudur** (*Empty Set Axiom*). Boş kümenin işareti,

$$\emptyset.$$

Ayrıca  $a$  ile  $b$  kümeysen, o zaman öyle bir küme vardır ki her elemanı, ya  $a$  kümesinin bir elemanı, ya da  $b$  kümesinin kendisidir. Bu yeni kümenin ifadesi,

$$a \cup \{b\}.$$

Bu topluluğun küme olduğu, **Bitiştirme Aksiyomudur** (*Adjunction Axiom*).<sup>†</sup> Burada  $a$  boş ise, yeni  $a \cup \{b\}$  kümesi,

$$\{b\}$$

olarak yazılır. O zaman aşağıdaki gibi kümelerimiz vardır:

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\}, \quad \left(\{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\}\right) \cup \left\{\{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\}\right\}.$$

Bu ifadelerin yerine

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \quad \left\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\right\}$$

ifadelerini yazabiliriz. Aslında 0 sayısını  $\emptyset$  olarak tanımlarız, yani

$$0 = \emptyset.$$

Bu sayı, **ilk ordinaldir**. Her  $\alpha$  ordinali için bir sonraki ordinal olacak, ve bu ordinal,  $\alpha \cup \{\alpha\}$  olacak. Mesela 0'dan bir sonraki ordinal  $\{0\}$  olacak; yani

$$1 = \{0\}$$

---

\*Buradaki  $\in$  işareti, Yunan  $\epsilon$  (epsilon) harfinden türer. Bu harf,  $\epsilon\sigma\tau\iota$  kelimesinin ilk harfidir, ve  $A \epsilon\sigma\tau\iota B$  cümlesi, “ $A$ ,  $B$ 'dir” ( $A$  is  $B$ ) anlamına gelir. Epsilonun bu kullanımını, Peano [17] ortaya koymuştur.

<sup>†</sup>Bu aksiyom, Tarski ve Givant [24, p. 223, QIII] kaynağında bulunur; İngilizce adı, Boolos [2, p. 100] kaynağında bulunur.



olacak. Ayrıca her  $\alpha$  ordinal için

$$\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$$

olacak. Ama bildiğimiz gibi

$$1 + 1 = 2, \quad 2 + 1 = 3, \quad 3 + 1 = 4,$$

vesaire. O zaman

$$\begin{aligned} 2 &= 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}, \\ 3 &= 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}, \\ 4 &= 3 \cup \{3\} = \{0, 1, 2, 3\}, \end{aligned}$$

vesaire. Böyle tanımlanmış sayılar, **von Neumann doğal sayılarıdır** (*von Neumann natural numbers* [26]). Bu sayılar, bir topluluğu oluşturacak, ve bu topluluk,  $\omega$  olacak. Yani  $\omega$ , öyle bir topluluktur ki

- 1)  $0 \in \omega$ ,
- 2)  $\alpha \in \omega$  ise  $\alpha + 1 \in \omega$ , ve
- 3)  $\omega$  topluluğunun başka elemanı yoktur.

Öyleyse  $\omega$  topluluğunun tanımı, **özyineli** veya **rekürsiftir** (*recursive*).

## 1.2 Ordinaler Hesapları

**Sonsuzluk Aksiyomuna\*** (*Axiom of Infinity* [28]) göre  $\omega$  topluluğu, bir küme olacak. O zaman  $\omega$  bir ordinal olacak, ve bu ordinalin her  $k$  elemanı için  $\omega + k$  kümesi, bir ordinal olacak.

Aslında tüm  $\alpha$  ile  $\beta$  ordinaler için

$$\alpha + \beta \text{ toplamını,} \quad \alpha \cdot \beta \text{ çarpımını, ve} \quad \alpha^\beta \text{ kuvvetini}$$

tanımlayacağız. O zaman

$$\begin{aligned} 1 + \omega &= \omega < \omega + 1, \\ 2 \cdot \omega &= \omega < \omega \cdot 2, \\ (\omega + 1)^\omega &= \omega^\omega < \omega^{\omega+1} \end{aligned}$$

olacak. Aslında:

---

\*Veya **Sonsuz Küme Aksiyomu** [16].

- $1 + \omega$  toplamı,

$$(0, 0, 1, 2, 3, \dots)$$

sırasının ordinalidir, ama  $\omega + 1$ ,

$$(0, 1, 2, 3, \dots, 0)$$

sırasının ordinalidir.

- $2 \cdot \omega$  çarpımı,

$$(0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots)$$

sırasının ordinalidir, ama  $\omega \cdot 2$ ,

$$(0, 1, 2, 3, \dots, 0, 1, 2, 3, \dots)$$

sırasının ordinalidir; ayrıca

$$2 \cdot \omega = 2 + 2 + 2 + \dots,$$

$$\omega \cdot 2 = \omega + \omega = \omega + 1 + 1 + 1 + \dots$$

(8 numaralı sayfaya bakın).

- $(\omega + 1)^\omega$  kuvveti,

$$((\omega + 1)^2, (\omega + 1)^3, (\omega + 1)^4, \dots)$$

dizisinin **limitidir**, ve

$$\begin{aligned} (\omega + 1)^2 &= (\omega + 1) \cdot (\omega + 1) \\ &= (\omega + 1) \cdot \omega + (\omega + 1) \cdot 1 \\ &= (\omega + 1 + \omega + 1 + \omega + 1 + \dots) + \omega + 1 \\ &= (\omega + \omega + \omega + \dots) + \omega + 1 \\ &= \omega^2 + \omega + 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\omega + 1)^3 &= (\omega + 1)^2 \cdot (\omega + 1) \\ &= (\omega^2 + \omega + 1) \cdot (\omega + 1) \\ &= (\omega^2 + \omega + 1) \cdot \omega + \omega^2 + \omega + 1 \\ &= (\omega^2 + \omega + 1 + \omega^2 + \omega + 1 + \omega^2 + \dots) + \omega^2 + \omega + 1 \\ &= (\omega^2 + \omega^2 + \dots) + \omega^2 + \omega + 1 \\ &= \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1, \end{aligned}$$

ve genelde

$$(\omega + 1)^n = \omega^n + \omega^{n-1} + \dots + \omega + 1.$$

Ayrıca her pozitif  $\alpha$  ordinali için öyle bir  $\ell$  doğal sayısı, ve  $\alpha_0, \dots, \alpha_\ell$  ordinalleri, ve  $a_0, \dots, a_\ell$  pozitif doğal sayıları vardır ki

$$\alpha_0 > \dots > \alpha_\ell, \quad \alpha = \omega^{\alpha_0} \cdot a_0 + \dots + \omega^{\alpha_\ell} \cdot a_\ell.$$

Burada  $\omega^{\alpha_0} \cdot a_0 + \dots + \omega^{\alpha_\ell} \cdot a_\ell$  ifadesi,  $\alpha$  ordinalinin **Cantor normal biçimidir** (*Cantor normal form*). Her pozitif ordinalin tek bir Cantor normal biçimi vardır. Bundan hesaplama kuralları türeyebilir.

### 1.3 Kümeler ve Sınıflar

Her topluluk, bir küme değildir. Örneğin öyle bir  $R$  topluluğu vardır ki her elemanı bir küme, ama bu küme, kendisinin elemanı değildir. Yani

$$R = \{x: x \notin x\}.$$

Burada  $x$  değişkeni her zaman bir küme olacak. Şimdi  $a$  bir küme olsun. Eğer  $a \in a$  ise, o zaman  $a \notin R$ , dolayısıyla  $a \neq R$ . Eğer  $a \notin a$  ise, o zaman  $a \in R$ , dolayısıyla  $a \neq R$ . Her durumda  $R$  topluluğu,  $a$  kümesi değildir. Yani  $R$ , bir küme değildir. Bu teoreme **Russell Paradoksu** denir [20].

Elemanları küme olan bazı topluluklar, **sınıf** olacak. Her küme, bir sınıftır, ancak bazı sınıflar, küme değildir. Mesela yukarıdaki gibi  $\{x: x \notin x\}$  topluluğu, bir sınıftır, ama gösterdiğimiz gibi küme değildir. Tanıma göre her sınıf,

$$\{x: \varphi(x)\}$$

biçiminde yazılabilir. Burada  $\varphi(x)$ , kümeler kuramının mantığında bir **formüldür**. Eğer  $a$  bir kümeysen, o zaman  $\varphi(a)$  ifadesi, bir **cümledir**. Her cümle, ya doğru ya yanlıştır. Bir  $\{x: \varphi(x)\}$  sınıfının elemanları,  $\varphi(a)$  cümesini doğru yapan  $a$  kümeleridir. Bu sınıf,  $\varphi(x)$  formülü tarafından **tanımlanır**.

Bir  $\varphi(x)$  formülünün bir ve tek bir **serbest değişkeni** vardır, ve bu değişken,  $x$  olur. Ancak bir formülün birden fazla serbest değişkeni olabilir. Örneğin

$$\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y)$$

ifadesi, bir formüldür, ve serbest değişkenleri,  $x$  ile  $y$  olur. Bu formülde  $z$ , **bağımlı değişkendir**. Formül, kümelerin **eşitlik** bağıntısını tanımlar. Yani  $a$  ile  $b$  kümeleri birbirine eşittir, ancak

$$\forall z (z \in a \Leftrightarrow z \in b),$$

yani elemanları aynıdır. Küme olmayan bir sınıf olduğunu kanıtlarken, bu kuralı kullandık. Yukarıdaki  $\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y)$  formülünün yerine

$$x = y$$

ifadesini yazarız. O halde bir  $\{x: x = x\}$  sınıfı vardır, ve bu sınıf, tüm kümelerin sınıfıdır. Bu sınıf, **evrensel sınıftır** (*universal class*), ve işareti,

**V**

olacak. Ayrıca  $a$  bir kümeysen, o zaman bir  $\{x: x \in a\}$  sınıfı vardır, ama bu sınıf,  $a$  kümenin kendisidir, yani

$$a = \{x: x \in a\}.$$

Öyleyse, dediğimiz gibi, her küme, bir sınıftır.

Sonsuzluk Aksiyomunu kullanmadan  $\omega$  topluluğunun sınıf olduğu apaçık değildir, ama sınıf olacaktır. Ondan sonra Sonsuzluk Aksiyomu,  $\exists x = \omega$  biçiminde olabilecektir.

Aslında  $\omega$  sınıfı bir küme olduğundan, **Yerleştirme Aksiyomuna** (*Replacement Axiom*)\* göre  $\{y: \exists x (x \in \omega \wedge y = \omega + x)\}$  sınıfı, bir küme olacaktır. Bu küme

$$\{\omega + x: x \in \omega\}$$

olarak yazılabilir. **Bileşim Aksiyomuna** (*Union Axiom* [28]) göre bu kümenin

$$\bigcup \{\omega + x: x \in \omega\} \quad \text{veya} \quad \bigcup_{x \in \omega} (\omega + x)$$

bileşimi de bir kümedir; tanıma göre bu bileşim,  $\omega + \omega$  toplamıdır.

---

\*Skolem [22], 1922 yılında bu aksiyomu tavsiye etti; aynı yılda Fraenkel, benzer bir aksiyomu tavsiye etmiş. Ayrıca Cantor'a [4, p. 114] bakın.

Kümelerden oluşturulmuş bazı topluluklar, sınıf değildir. Bu sonuç, **Gödel'in Eksiklik Teoremi** (*Gödel's Incompleteness Theorem* [11]) veya **Tarski'nin Doğruluğun Tanımlanamaması Teoremi** (*Tarski's Theorem on the Indefinability of Truth* [23]) gibidir. Bu teoremlerin asıl biçimleri,  $\mathbb{N}$  topluluğu hakkındadır, ve bu biçimde teoremlerini kanıtlamak zordur. Fakat bu teoremler,  $\mathbf{V}$  hakkında yazılabilir; ve bu biçimde onları kanıtlamak daha kolaydır.

Tüm ordinalerin topluluğu, bir sınıf olacak, ve bu sınıfın işareti

**ON**

olacak. Aslında bu sınıf, bir  $a$  kümesiye, o zaman  $a \in \mathbf{ON}$  olurdu, yani  $a \in a$  olurdu; ama bir ordinal için bu içerme imkânsızdır. Sonuç olarak **ON**, bir küme değildir. Bu teorem, **Burali-Forti Paradoksu** [3] olarak bilinir.

## 1.4 Kardinaller

**ON** sınıfının bir sıralaması vardır, ve bu sıralama, *içerilmedir*, yani  $\in$  ile gösterilen sıralamadır. **Seçim Aksiyomuna** (*Axiom of Choice* [28]) göre, her  $a$  kümesinden bir  $\beta$  ordinaline giden bir **eşleme** (yani bir birebir örten gönderme) vardır. O halde

$$a \approx \beta$$

ifadesini yazalım, ve  $a$  ile  $\beta$  kümelerine **eşlenik** densin [16, s. 82]. Eğer  $a$  verilirse, ve  $a \approx \beta$  koşulunu sağlayan  $\beta$  ordinallerinin en küçüğü  $\kappa$  ("kappa") ise, o zaman  $\kappa$ ,  $a$  kümesinin **kardinalidir**. Tüm kardinallerden oluşturulmuş topluluk, bir sınıf olacak, ve bu sınıfın işareti

**KN**

olacak. En küçük *sonsuz* kardinal,  $\omega$  olur. **ON** sınıfından **KN** sınıfına giden bir

$$\xi \mapsto \aleph_\xi$$

göndermesi vardır. Burada

$$\aleph_0 = \omega \quad \text{ve} \quad \alpha < \beta \Leftrightarrow \aleph_\alpha < \aleph_\beta,$$

ve her sonsuz kardinal, bir  $\alpha$  ordinali için,  $\aleph_\alpha$  biçimindedir. İki kardinalin *kardinal* toplamı ve *kardinal* çarpımı vardır, ama

$$\aleph_\alpha \oplus \aleph_\beta = \aleph_\alpha \otimes \aleph_\beta = \aleph_{\max(\alpha, \beta)}$$

Ayrıca  $1 \leq k < \omega$  ise  $\aleph_\alpha \oplus k = k \oplus \aleph_\alpha = \aleph_\alpha \otimes k = k \otimes \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$ .

Genelde siyah harfler, sınıfları gösterecek. Şimdi **A** ile **B**, sınıf olsun. Eğer **A** sınıfının her elemanı, **B** sınıfının elemanıysa, o zaman **A** sınıfına **B sınıfının alt sınıfı** (*subclass of the class B*) denir, ve

$$\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$$

ifadesi yazılır. Bu durumda **B** sınıfı, **A** sınıfını **kapsar** (*includes*). İçerilme ( $\in$ ) ve kapsanma ( $\subseteq$ ) ilişkileri, birbirinden tamamen farklıdır.

**Ayırma Aksiyomuna** (*Separation Axiom* [28]) göre, her *kümenin* her alt sınıfı, bir kümedir. Şimdi, eğer  $\varphi(x)$  bir formül ise, ve  $a$  bir kümeysen, o zaman öyle bir sınıf vardır ki her elemanı, hem  $a$  kümesinin elemanıdır, hem de  $\varphi(x)$  formülünü sağlar. Bu sınıf,

$$\{x \in a : \varphi(x)\}$$

olarak yazılır. Ayırma Aksiyomuna göre, bu sınıf, bir kümedir. O zaman bu küme,  $a$  **kümesinin bir altkümesidir** (*a subset of the set a*).

Bir  $a$  kümesinin tüm altkümeleri, bir sınıf oluşturur. Bu sınıf,  $a$  kümesinin **kuvvet sınıfıdır** (*power class*), ve

$$\mathcal{P}(a)$$

olarak yazılır. **Kuvvet Kümesi Aksiyomuna** (*Power Set Axiom* [28]) göre, bu sınıf, her zaman bir kümedir. **Cantor'un Teoremine**\* göre, her kümenin kuvvet kümesi, kümeden kesinlikle daha büyüktür, yani kardinali daha büyüktür. Bu teorem,

$$a \prec \mathcal{P}(a)$$

ifadesiyle söylenir.

---

\*Levy'ye [13] göre Cantor, bu teoremi 1892 yılında yayımladı.

Eğer  $a$  ile  $b$ , iki kümeysen, o zaman  $a$  kümesinden  $b$  kümesine giden göndermeler topluluğu, bir kümedir, ve bu küme

$${}^a b$$

olarak yazılabilir. O zaman  ${}^a 2 \approx \mathcal{P}(a)$ . Eğer  $\kappa$  ile  $\lambda$ , iki kardinal ise, tanıma göre

$$\kappa^\lambda$$

kuvveti,  ${}^\lambda \kappa$  kümesinin kardinalidir. Eğer  $2 \leq \kappa \leq \lambda$  ise, o zaman

$$2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq (2^\kappa)^\lambda = 2^{\kappa \cdot \lambda} = 2^\lambda;$$

özel olarak  $\kappa^\lambda = 2^\lambda$ .

Şimdi  $\mathbb{Z}$ , **tamsayılar** topluluğu olsun. O zaman  $\mathbb{Z} \approx \omega$ , çünkü tamsayılar, sonsuz bir

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, \dots$$

listesinde yazılabilir. Ayrıca her tamsayı,  $\omega$  kümesinin elemanları gibi, bir küme olarak düşünülebilir. Bunu göstermek için, eğer  $a$  ile  $b$ , herhangi iki kümeysen, o zaman

$$(a, b)$$

**sıralı ikilisi** (*ordered pair*),  $\{\{a\}, \{a, b\}\}$  kümesi olarak tanımlanır.\* O zaman  $n \in \omega$  ve  $n > 0$  ise, o zaman  $-n$  tamsayısı,  $(0, n)$  olarak tanımlanabilir.

Başka yöntemle  $\mathbb{Z}$  topluluğunun her  $r$  elemanını,

$$\{(x, y) \in \omega \times \omega : x = y + r\}$$

olarak tanımlanabiliriz. Bu tanıma göre  $\mathbb{Z}$  topluluğunun her elemanı, bir **denklik sınıfıdır**. Aslında  $\omega \times \omega$  çarpımında öyle bir  $E$  **denklik bağıntısı** vardır ki

$$(a, b) E (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c,$$

ve  $\mathbb{Z}$  topluluğu,  $(\omega \times \omega)/E$  bölümü olarak tanımlanabilir.

Öyleyse  $\mathbb{Z}$  topluluğu, bir sınıftır. O zaman Yerleştirme Aksiyomuna göre  $\mathbb{Z}$ , bir küme olmalı, çünkü  $\mathbb{Z} \approx \omega$ .


---

\*Bu, Kuratowski'nin tanımıdır [12]. Daha önce, Wiener [27] daha karmaşık bir tanım verdi.

Benzer şekilde  $\mathbb{Q}$  **kesirli sayılar** topluluğu, öyle bir  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/F$  bölümüdür ki

$$(a, b) F (c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

Aslında  $\mathbb{Q} \approx \omega$ , çünkü kesirli sayılar, aşağıdaki “Stern–Brocot ağacı” olarak, ve ondan sonra bir liste olarak, yazılabilir.



Şimdi  $\mathbb{R}$ , **gerçel sayılar** topluluğu olsun. Her kesirli sayı, gerçel sayı olarak düşünülebilir. Ayrıca her iki farklı gerçel sayının arasında bir kesirli sayı vardır. O zaman  $\mathbb{R}$  topluluğundan  $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$  kuvvet kümesine giden öyle bir  $h$  göndermesi vardır ki her  $a$  gerçel sayısı için

$$h(a) = \{x \in \mathbb{Q} : x < a\},$$

ve bu gönderme, birebirdir. Öyleyse  $a$  sayısı,  $h(a)$  kümesi olarak düşünülebilir, ve  $\mathbb{R}$ , bir kümedir. Ayrıca

$$\mathbb{R} \preceq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \approx \mathcal{P}(\omega) \quad \text{ve} \quad \mathcal{P}(\omega) \preceq \mathbb{R}.$$



Örneğin

$$\mathcal{P}(\omega) \approx \omega^2$$

çünkü  $\omega^2$  kümesinden  $\mathcal{P}(\omega)$  kümesine giden bir

$$f \mapsto \{x \in \omega : f(x) = 1\}$$

eşlemesi vardır, ve ayrıca  $\omega^2$  kümesinden  $\mathbb{R}$  kümesine giden bir birebir

$$f \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2 \cdot f(k)}{3^{k+1}}$$

göndermesi vardır. Sonuç olarak, **Schröder–Bernstein Teoremine** göre

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\omega),$$

çünkü bu teoreme göre tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için

$$a \preceq b \preceq a \Rightarrow a \approx b.$$

Şimdi Cantor'un Teoreminden  $\omega \prec \mathbb{R}$ . Özel olarak öyle bir  $\alpha$  olacak ki  $\alpha > 0$  ve  $\mathbb{R} \approx \aleph_\alpha$ . Ama  $\alpha$  ordinalinin 1 olup olmadığını bilmiyoruz. **Kontinü Hipotezine** (*Continuum Hypothesis*) göre  $\alpha = 1$ , yani  $\omega \preceq a \prec \mathcal{P}(\omega)$  ise  $a \approx \omega$ . **Genelleştirilmiş Kontinü Hipotezine** (*Generalized Continuum Hypothesis*) göre her sonsuz  $b$  kümesi için  $b \preceq c \prec \mathcal{P}(b)$  ise  $b \approx c$ .

Seçim Aksiyomu hariç kümeler kuramının kullanacağımız aksiyomları, *Zermelo–Fraenkel Aksiyomlarıdır*. Aslında Zermelo'nun verdiği aksiyomlar [28], aşağıdadır.

- I. *Uzama* (22 numaralı sayfada).
- II. **Temel Kümeler** (*Elementary Sets*):  $\emptyset$ ,  $\{a\}$ , ve  $\{a, b\}$  toplulukları, kümedir.
- III. *Ayrırma* (10 numaralı sayfada).
- IV. *Kuvvet Kümesi* (10 numaralı sayfada).
- V. *Bileşim* (8 numaralı sayfada).
- VI. *Seçim* (9 numaralı sayfada).
- VII. *Sonsuzluk* (5 numaralı sayfada).

(4 numaralı sayfadaki Bitiştirme Aksiyomumuz, Zermelo'nun II. ve V. aksiyomları tarafından gerektirilir. Ters olarak Bitiştirme ve Boş Küme Aksiyomlarımız, Zermelo'nun II. aksiyomunu gerektirir.) Sonra iki aksiyom daha verildi:

VIII. Yerleştirme (8 numaralı sayfada).

IX. **Temellendirme** (*Foundation* [22]): Her boş olmayan  $a$  kümesinin öyle bir  $b$  elemanı vardır ki  $a \cap b = \emptyset$  (25 numaralı sayfaya bakın).

I–V ile VII–IX numaralı aksiyomlar, **Zermelo–Fraenkel Aksiyomlarıdır.**

Birkaç tane kısaltmalar kullanılır:

AC = Seçim Aksiyomu,

ZF = Zermelo–Fraenkel Aksiyomları,

ZFC = Zermelo–Fraenkel Aksiyomlarıyla Seçim Aksiyomu,

KH = Kontinü Hipotezi,

GKH = Genelleştirilmiş Kontinü Hipotezi.

O zaman

$$\text{ZFC} = \text{ZF} + \text{AC}.$$

Gödel'in kanıtladığı teoreme göre ZF **tutarlıysa** (yani ondan bir çelişki çıkmazsa), o zaman ZFC aksiyomları da tutarlıdır, ve ayrıca ZFC aksiyomlarıyla GKH tutarlıdır [9, 10]. Sierpiński [21],

$$\text{ZF} + \text{GKH} \Rightarrow \text{AC}$$

gerektirmesinin gösterdi.\* Cohen'in [5] kanıtladığı teoreme göre ZF tutarlıysa, o zaman  $\text{ZF} + \neg\text{AC}$  aksiyomları da tutarlıdır, ve ayrıca  $\text{ZFC} + \neg\text{KH}$  tutarlıdır. Sierpiński'nin teoremi, aşağıdaki 101 numaralı teorem olacaktır; Gödel'in ve Cohen'in teoremlerini kanıtlamayacağız.

---

\*Sierpiński'ye göre 1926 yılında Lindenbaum ve Tarski, bu gerektirmesini ilan ettiler, ama kanıtı vermediler.

## 2 Mantık

### 2.1 Formüller

Formüllerde kullanacağımız simgelerin birkaç tane türü vardır:

- 1) **değişkenler** (*variables*):  $z, y, x, \dots; x_0, x_1, x_2, \dots;$
- 2) **sabitler** (*constants*):  $a, b, c, \dots; a_0, a_1, a_2, \dots;^*$
- 3) **ikili bağlayıcılar** (*binary connectives*):  $\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow;^\dagger$
- 4) bir **birli bağlayıcı** (*singularly connective*):  $\neg;$
- 5) **niceleyiciler** (*quantifiers*):  $\exists, \forall;$
- 6) **ayraçlar** (*parentheses, brackets*):  $(, );$
- 7) bir **yüklem** (*predicate*):  $\in$  (epsilon).<sup>‡</sup>

Bir **terim** (*term*), ya değişken ya da sabittir. Eğer  $t$  ile  $u$ , iki terim ise, o zaman

$$t \in u$$

ifadesi, bir **bölünemeyen formüldür** (*atomic formula*). Genelde **formüllerin** tanımı, özyinelidir:

1. Bölünemeyen bir formül, bir formüldür.
2. Eğer  $\varphi$ , bir formül ise, o zaman

$$\neg\varphi$$

ifadesi de bir formüldür.

---

\*Bilinen değerler için Latin alfabesinin başlangıcından harflerin kullanılışı, ve bilinmeyen değerler için Latin alfabesinin sonundan harflerin kullanılışı, Descartes'te [7] görünür.

†Bazen  $\Rightarrow$  ile  $\Leftrightarrow$  oklarının yerine  $\rightarrow$  ile  $\leftrightarrow$  işaretleri yazılır. Bunları kalemle yazmak daha kolaydır. Ama bu notlarda,  $\mathbf{F}: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$  ifadesi,  $\mathbf{F}$  göndermesinin  $\mathbf{A}$  sınıfından  $\mathbf{B}$  sınıfına gittiğinin anlamına gelecek. Aşağıdaki 36 numaralı sayfaya bakın.

‡Yukarıdaki 4 numaralı sayfadaki dipnota bakın.

3. Eğer  $\varphi$  ile  $\psi$ , iki formül ise, o zaman

$$(\varphi \wedge \psi), \quad (\varphi \vee \psi), \quad (\varphi \Rightarrow \psi), \quad (\varphi \Leftrightarrow \psi)$$

ifadeleri de, formüldür.

4. Eğer  $\varphi$  bir formül ise, ve  $x$  bir değişken ise, o zaman

$$\exists x \varphi, \quad \forall x \varphi$$

ifadeleri de formüldür.

Formüllerin her türünün adı vardır:

1.  $\neg\varphi$  formülü, bir **değillemedir** (*negation*).
2.  $(\varphi \wedge \psi)$  formülü, bir **birleşme** veya **tümel evetlemedir** (*conjunction*).
3.  $(\varphi \vee \psi)$  formülü, bir **ayrılma** veya **tikel evetlemedir** (*disjunction*).
4.  $(\varphi \Rightarrow \psi)$  formülü, bir **gerektirme** (*implication*).
5.  $(\varphi \Leftrightarrow \psi)$  formülü, bir **denkliktir** (*equivalence*).
6.  $\exists x \varphi$  formülü, bir **örneklemedir** (*instantiation*).
7.  $\forall x \varphi$  formülü, bir **genelleştirmedir** (*generalization*).

Bu türlerin adları, çok önemli değildir. Fakat aşağıdaki teorem çok önemlidir.

**Teorem 1.** *Her formülün tek bir şekilde tek bir türü vardır.*

Mesela aynı formül, hem gerektirme, hem örnekleme olamaz:  $\exists x (\varphi \Rightarrow \psi)$  formülü, gerektirme değil, örneklemedir;  $(\exists x \varphi \Rightarrow \psi)$  formülü, örnekleme değil, gerektirmedir.

Ayrıca  $(\varphi \wedge (\psi \wedge \theta))$  formülü, tek bir şekilde birleşmedir. Aslında sadece  $\varphi$  ile  $(\psi \wedge \theta)$  formüllerinin birleşmesidir. Eğer  $A$  harfi,  $\varphi \wedge (\psi$  ifadesini gösterirse ve  $B$  harfi,  $\theta)$  ifadesini gösterirse, o zaman  $(A \wedge B)$  ifadesi,  $(\varphi \wedge (\psi \wedge \theta))$  formülünü gösterir; ama tanıma göre bu formül,  $A$  ile  $B$  ifadelerinin birleşmesi değildir, çünkü  $A$  ile  $B$  ifadeleri (yani  $A$  ile  $B$  tarafından gösterilen ifadeler), formül değildir.

Teoremi kanıtlamayacağız. Fakat teoremi kullanarak aşağıdaki özyineli tanımı yapabiliriz. Bir değişkenin bir formülde birkaç tane **geçiş** (*occurrence*) olabilir. Mesela  $\forall x (x \in y \Leftrightarrow x \in z)$  formülünde  $x$  değişkeninin üç tane geçişi vardır (ve  $y$  ile  $z$  değişkenlerinin birer geçişi vardır).

1. Bölünemeyen bir formülde bir değişkenin her geçişi, **serbest** bir geçiştir.
2. Bir değişkenin  $\varphi$  formülündeki her serbest geçişi,  $\neg\varphi$ ,  $(\varphi * \psi)$ , ve  $(\psi * \varphi)$  formüllerinde de serbesttir. (Burada  $*$  işareti, herhangi bir ikili bağlayıcıdır.)
3. Eğer  $x$  ile  $y$ , iki *farklı* değişken ise, o zaman  $x$  değişkeninin  $\varphi$  formülünde her serbest geçişi,  $\exists y \varphi$  ile  $\forall y \varphi$  formüllerinde de serbesttir.
4.  $\exists x \varphi$  ile  $\forall x \varphi$  formüllerinde  $x$  değişkeninin hiç serbest geçişi yoktur.

Bir formülde bir değişkenin serbest geçişi varsa, bu değişken, formülün bir **serbest değişkenidir**. Serbest değişkeni olmayan bir formül, bir **cümledir**. Cümleler için  $\sigma$ ,  $\tau$ , ve  $\rho$  gibi Yunan harflerini kullanacağız.

## 2.2 Doğruluk ve Yanlışlık

Bir  $\varphi$  formülünün tek serbest değişkeni  $x$  ise, o zaman formül

$$\varphi(x)$$

olarak yazılabilir. O halde  $a$  bir sabit ise, ve  $x$  değişkeninin  $\varphi$  formülündeki her *serbest* geçişinin yerine  $a$  konulursa, çıkan cümle

$$\varphi(a)$$

olarak yazılabilir. Şimdi **doğruluğu** (*truth*) ve **yanlışlığı** (*falsehood*) tanımlayabiliriz:

1. Eğer  $b$  kümesi,  $a$  kümesini içerirse, o zaman  $a \in b$  cümlesi doğrudur; içermezse, yanlıştır.
2. Eğer  $\sigma$  cümlesi doğruysa, o zaman  $\neg\sigma$  değillemesi yanlıştır;  $\sigma$  yanlış ise,  $\neg\sigma$  doğrudur.
3. Eğer hem  $\sigma$  hem  $\tau$  doğruysa, o zaman  $(\sigma \wedge \tau)$  birleşmesi de doğrudur;  $\sigma$  ile  $\tau$  cümlelerinin biri yanlış ise, birleşmesi de yanlıştır.
4. Eğer bir  $a$  kümesi için  $\varphi(a)$  cümlesi doğruysa, o zaman  $\exists x \varphi(x)$  örnekleme de doğrudur; hiç öyle bir  $a$  yoksa, örnekleme yanlıştır.
5.  $(\sigma \vee \tau)$  cümlesi,  $\neg(\neg\sigma \wedge \neg\tau)$  cümlesinin anlamına gelir, yani bu iki cümle aynı zamanda ya doğrudur, ya da yanlıştır.
6.  $(\sigma \Rightarrow \tau)$  cümlesi,  $(\neg\sigma \vee \tau)$  cümlesinin anlamına gelir.

7.  $(\sigma \Leftrightarrow \tau)$  cümlesi,  $((\sigma \Rightarrow \tau) \wedge (\tau \Rightarrow \sigma))$  cümlesinin anlamına gelir.  
 8.  $\forall x \varphi(x)$  cümlesi,  $\neg \exists x \neg \varphi(x)$  cümlesinin anlamına gelir.

Özel olarak formüllerde  $\vee$ ,  $\Rightarrow$ ,  $\Leftrightarrow$ , ve  $\forall$  simgeleri gerekmez; sadece kolaylık için kullanacağız. Ama  $(\sigma \Rightarrow \tau)$  cümlesi doğrudur ancak ve ancak  $\tau$  doğru veya  $\sigma$  yanlıştır; ve  $(\sigma \Leftrightarrow \tau)$  cümlesi doğrudur ancak ve ancak hem  $\sigma$  hem  $\tau$  ya doğru ya yanlıştır. Ayrıca  $\forall x \varphi(x)$  doğrudur ancak ve ancak her  $a$  kümesi için  $\varphi(a)$  doğrudur.

Birkaç tane kısaltma daha kullanırız:

1.  $\neg t \in u$  formülünün yerine  $t \notin u$  ifadesini yazarız;
2. Bir  $(\varphi * \psi)$  formülünün en dıştaki ayraçlarını yazmayız.
3.  $\Rightarrow$  ile  $\Leftrightarrow$  bağlayıcılarına göre  $\wedge$  ile  $\vee$  bağlayıcılarına önceliği veririz: Mesela  $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \chi$  ifadesi,  $(\varphi \wedge \psi) \Rightarrow \chi$  formülünün anlamına gelir.
4.  $\varphi \Rightarrow \psi \Rightarrow \chi$  ifadesi,  $\varphi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \chi)$  formülünün anlamına gelir.

Bir  $\varphi$  formülünün serbest değişkenleri  $x$  ile  $y$  ise, o zaman formül

$$\varphi(x, y)$$

olarak yazılabilir. O halde  $a$  ile  $b$ , iki sabit ise, ve  $x$  değişkeninin  $\varphi$  formülündeki her serbest geçişinin yerine  $a$  konulursa, ve benzer şekilde  $y$  değişkeninin her serbest geçişinin yerine  $b$  konulursa, çıkan cümle

$$\varphi(a, b)$$

olarak yazılabilir.

Genelde  $\varphi$  formülünün serbest değişkenleri, bir  $\vec{x}$  listesini oluşturursa, o zaman formül

$$\varphi(\vec{x})$$

olarak yazılabilir; ayrıca

$$\forall \vec{x} \varphi(\vec{x}), \quad \exists \vec{x} \varphi(\vec{x})$$

cümleleri yazılabilir. Eğer  $\vec{a}$ , uzunluğun  $\vec{x}$  listesinin uzunluğu olan bir sabit listesiyse, o zaman

$$\varphi(\vec{a})$$

cümlesi de çıkar. Eğer  $\varphi(\vec{x})$  ile  $\psi(\vec{x})$ , iki formül ise, ve *sadece doğruluğun tanımını kullanarak*

$$\forall \vec{x} (\varphi(\vec{x}) \Leftrightarrow \psi(\vec{x}))$$

cümlesinin doğruluğu kanıtlanabilirse, o zaman  $\varphi$  ile  $\psi$  birbirine (**mantığa göre**) **denktir** (*logically equivalent*). Öyleyse  $\varphi$  ile  $\psi$  birbirine denktir, ancak ve ancak her  $\vec{a}$  sabit listesi için, *doğruluğun tanımına göre*

$$\varphi(\vec{a}) \Leftrightarrow \psi(\vec{a})$$

cümlesi doğrudur. Örneğin, yukarıdaki tanımlara göre

$$\begin{aligned} \varphi \vee \psi \text{ denktir } & \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\ \varphi \Rightarrow \psi \text{ denktir } & \neg\varphi \vee \psi, \\ \varphi \Leftrightarrow \psi \text{ denktir } & (\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi), \\ \forall x \varphi \text{ denktir } & \neg\exists x \neg\varphi. \end{aligned}$$

Ama  $\exists y \forall x (\varphi(x) \Rightarrow x \in y)$  ile  $\exists y \forall x (\varphi(x) \Leftrightarrow x \in y)$ , denk değildir.

### **Teorem 2.**

1. Her formül, kendisine denktir.
2. Eğer  $\varphi$  ile  $\psi$  denk ise, o zaman  $\psi$  ile  $\varphi$  denktir.
3. Eğer  $\varphi$  ile  $\psi$  denk ise, ve  $\psi$  ile  $\chi$  denk ise, o zaman  $\varphi$  ile  $\chi$  denktir.

*Kanıt.* 1.  $\sigma \Leftrightarrow \sigma$  her zaman doğrudur.

2.  $\sigma \Leftrightarrow \tau$  doğru olsun. O zaman hem  $\sigma$  hem  $\tau$  ya doğru ya yanlıştır. Öyleyse hem  $\tau$  hem  $\sigma$  ya doğru ya yanlıştır; yani  $\tau \Leftrightarrow \sigma$  doğrudur.

3.  $\sigma \Leftrightarrow \tau$  ve  $\tau \Leftrightarrow \rho$  doğru olsun. Eğer  $\sigma$  doğruysa, o zaman  $\tau$  doğru olmalı, ve sonuç olarak  $\rho$  doğru olmalı, dolayısıyla  $\sigma \Leftrightarrow \rho$  doğrudur. Benzer şekilde  $\sigma$  yanlıştır ise  $\sigma \Leftrightarrow \rho$  tekrar doğrudur.  $\square$

### **Teorem 3.**

1.  $\varphi \Rightarrow \psi \Rightarrow \chi$  ile  $\varphi \wedge \psi \Rightarrow \chi$  denktir.
2. Eğer  $x$  değişkeni,  $\varphi$  formülünde serbest değilse, o zaman  $\forall x (\varphi \Rightarrow \psi)$  ile  $\varphi \Rightarrow \forall x \psi$  denktir.

*Kanıt.* 1.  $\sigma \Rightarrow \tau \Rightarrow \rho$  doğru olsun. Eğer  $\sigma \wedge \tau$  cümlesi de doğruysa, o zaman hem  $\sigma$  hem  $\tau$  doğrudur, ve sonuç olarak  $\tau \Rightarrow \rho$  doğrudur, ve  $\rho$  doğrudur. Yani  $\sigma \wedge \tau \Rightarrow \rho$  doğrudur.

Tersi için  $\sigma \wedge \tau \Rightarrow \rho$  doğru olsun. O zaman  $\sigma \wedge \tau$  yanlış veya  $\rho$  doğrudur. Yani  $\sigma$  yanlış, veya  $\tau$  yanlış, veya  $\rho$  doğrudur. Eğer  $\sigma$  doğruysa, o zaman  $\tau$  yanlış, veya  $\rho$  doğrudur, yani  $\tau \Rightarrow \rho$  doğrudur. Sonuç olarak  $\sigma \Rightarrow \tau \Rightarrow \rho$  doğrudur.

2.  $\forall x (\sigma \Rightarrow \varphi(x))$  doğru olsun. O zaman her  $a$  için  $\sigma \Rightarrow \varphi(a)$  doğrudur. Sonuç olarak  $\sigma$  doğruysa, o zaman her  $a$  için  $\varphi(a)$  doğrudur. Yani  $\sigma \Rightarrow \forall x \varphi(x)$  doğrudur.

Benzer şekilde  $\sigma \Rightarrow \forall x \varphi(x)$  doğruysa  $\forall x (\sigma \Rightarrow \varphi(x))$  doğrudur.  $\square$

## 2.3 Eşitlik

Yukarıdaki 8 numaralı sayfada dediğimiz gibi

$$t = u$$

ifadesi,  $\forall x (x \in t \Leftrightarrow x \in u)$  formülünün kısaltması olarak kullanılabilir. Burada  $x$ , herhangi bir değişken olabilir, ama  $t$  ile  $u$  terimlerinden farklı olmalıdır. Örneğin  $x = y$  ifadesi,  $\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y)$  formülünün kısaltmasıdır, ama  $\forall x (x \in x \Leftrightarrow x \in y)$  formülünün kısaltması değildir.

Tanım göre

$$t = u \text{ denktir } \forall x (x \in t \Leftrightarrow x \in u).$$

O zaman

$$\forall x \forall y (x = y \Leftrightarrow \forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y)) \quad (*)$$

cümlesi doğrudur. Yani tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için

$$a = b \Leftrightarrow \forall x (x \in a \Leftrightarrow x \in b)$$

cümlesi doğrudur. Bu cümle,  $\Leftrightarrow$  simgesinin tanımına göre, iki cümlenin birleşmesine denktir, ve bu cümleler,

$$a = b \Rightarrow \forall x (x \in a \Leftrightarrow x \in b), \quad \forall x (x \in a \Leftrightarrow x \in b) \Rightarrow a = b.$$



O zaman tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için, hem

$$\forall x (x \in a \Leftrightarrow x \in b) \Rightarrow a = b$$

doğrudur, hem de, 3 numaralı teoreme göre, her  $c$  kümesi için,

$$a = b \wedge c \in a \Rightarrow c \in b$$

doğrudur.

Bizim için, (\*) cümlesinin doğruluğu, bir tanımdır. Yani, simgesi  $\in$  olan **içerilme** bağıntısı, temel bir bağıntıdır, ama **eşitlik** bağıntısı, yukarıdaki (\*) cümlesini sağlayan bir  $=$  bağıntısıdır.

**Teorem 4.** *Tüm  $a$ ,  $b$ , ve  $c$  kümeleri için*

$$a = a, \quad a = b \Rightarrow b = a, \quad a = b \wedge b = c \Rightarrow a = c$$

*cümleleri doğrudur.*

**Alıştırma 1.** Teoremi kanıtlayın.

Teoreme göre eşitlik bağıntısı, **dönümlü** (*reflexive*), **simetrik** (*symmetric*), ve **geçişli** (*transitive*) bir bağıntıdır, yani bir **denklik bağıntısıdır** (*equivalence relation*).

Teoremin dolayısıyla  $a = b \wedge b = c$  cümlesinin kısaltması olarak  $a = b = c$  ifadesi yazılır; yani

$$a = b = c \text{ denktir } a = b \wedge b = c.$$

İlk resmi aksiyomumuz şu:

**AKSİYOM 1** (Eşitlik). *Tüm  $a$ ,  $b$ , ve  $c$  kümeleri için*

$$a = b \wedge a \in c \Rightarrow b \in c$$

*cümlesi doğrudur. Yani*

$$\forall x \forall y \forall z (x = y \wedge x \in z \Rightarrow y \in z)$$

*cümlesi doğrudur.*

Bu aksiyomun başka biçimleri vardır, mesela:

1. Tüm  $a$ ,  $b$ , ve  $c$  kümeleri için  $a = b \Rightarrow a \in c \Rightarrow b \in c$ .
2. Tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $\forall x (a = b \Rightarrow a \in x \Rightarrow b \in x)$ .
3. Tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $\forall x (a = b \wedge a \in x \Rightarrow b \in x)$ .
4. Tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $a = b \Rightarrow \forall x (a \in x \Rightarrow b \in x)$ .
5.  $\forall x \forall y (x = y \Rightarrow \forall z (x \in z \Rightarrow y \in z))$ .
6.  $\forall x \forall y \forall z (x = y \Rightarrow x \in z \Rightarrow y \in z)$ .

*Alıştırma 2.*  $a = b \wedge \forall x (a \in x \Rightarrow b \in x)$  cümlesi, Eşitlik Aksiyomundan kanıtlanabilir mi?

**Teorem 5.** Her  $\varphi(x)$  tek serbest değişkenli formülü için

$$a = b \wedge \varphi(a) \Rightarrow \varphi(b) \quad (\dagger)$$

cümlesi doğrudur.

*Kanıt.* Formüllerin özyineli tanımı nedeni ile, *tümevarım* kullanabiliriz.

1. İlk olarak  $\varphi$  bölünmesin. Yani  $\varphi(x)$ , ya  $c \in x$  veya  $x \in c$  biçiminde olsun. O zaman  $(\dagger)$  cümlesi, ya eşitliğin tanımından, ya da Eşitlik Aksiyomundan, doğrudur.
2. Eğer  $\varphi$ , ya  $\psi$  ya da  $\chi$  ise,  $(\dagger)$  doğru olsun. Şimdi  $a = b \wedge (\psi(a) \wedge \chi(a))$  doğru olsun. O zaman hem  $a = b \wedge \psi(a)$  hem  $a = b \wedge \chi(a)$  doğru olmalı. Sonuç olarak varsayımımızdan hem  $\psi(b)$  hem  $\chi(b)$  doğru olmalı, yani  $\psi(b) \wedge \chi(b)$  doğru olmalı. Öyleyse  $\varphi$ ,  $\psi \wedge \chi$  ise  $(\dagger)$  doğrudur.
3. Son olarak, tüm  $c$  için  $\varphi(x)$ ,  $\psi(x, c)$  ise,  $(\dagger)$  doğru olsun. Şimdi  $a = b \wedge \exists y \varphi(a, y)$  doğru olsun. O zaman bir  $c$  için  $a = b \wedge \varphi(a, c)$  doğru olmalı, dolayısıyla  $\varphi(b, c)$  doğru olmalı. Sonuç olarak  $\exists y \varphi(b, y)$  doğrudur. Öyleyse  $\varphi(x)$ ,  $\exists y \varphi(x, y)$  ise  $(\dagger)$  doğrudur.  $\square$

Kitapların çoğunda hem  $\in$  hem  $=$ , temel bağıntıdır, ve yukarıdaki 20 numaralı sayfadaki  $(*)$  cümlesi, tanım değil, **Uzama Aksiyomudur\*** (*Axiom of Extensionality* [28]). Bu kitaplarda her  $\varphi(x)$  tek serbest değişkenli formülü için  $(\dagger)$  cümlesi, bir **mantıksal aksiyomdur**.

---

\*Veya **Küme Eşitliği Aksiyomu** [16].

## 2.4 Sınıflar

Bir  $\varphi(x)$  formülü ve bir  $a$  kümesi için  $\varphi(a)$  cümlesi doğruysa  $a$  kümesi,  $\varphi(x)$  formülünü **sağlar** (*satisfies*). O zaman  $\varphi$  formülünü sağlayan kümeler topluluğu vardır. Bu topluluk

$$\{x: \varphi(x)\}$$

olarak yazılır, ve ona  $\varphi$  **tarafından tanımlanmış sınıf** (*class defined by  $\varphi$* ) denir.

Yukarıdaki 15 numaralı sayfadaki tanıma göre bir değişken veya sabit, bir *terimdir*. Daha kesinlikle bir **küme terimidir** (*set term*). Şimdi, eğer  $x$  değişkeni,  $\varphi$  formülünün serbest bir değişkeniyse,  $\varphi$  formülünü

$$\varphi(\dots x \dots)$$

olarak yazabiliriz. O zaman

$$\{x: \varphi(\dots x \dots)\}$$

ifadesi, bir **sınıf terimi** (*class term*) olacak. Sınıf terimlerini formüllerde kullanabiliriz, ama şimdilik, sadece  $\in$  işaretinin sağında. Bir  $x$  değişkeninin bir  $\varphi(\dots y \dots)$  formülündeki serbest geçişi, bir

$$t \in \{y: \varphi(\dots y \dots)\}$$

formülünde (hâlâ) serbesttir. Eğer  $x$  değişkeninin  $\varphi(\dots x \dots)$  formülündeki her serbest geçişinin yerine  $a$  sabitini koyarsak  $\varphi(\dots a \dots)$  formülü çıkar. Şimdi tanıma göre

$$a \in \{x: \varphi(\dots x \dots)\} \text{ denktir } \varphi(\dots a \dots).$$

Bir sabit veya bir  $\{x: \varphi(x)\}$  sınıf terimi, **kapalı** (*closed*) bir terimdir. Kapalı bir terim, bir kümenin veya bir sınıfın adıdır. **A**, **B**, **C** gibi büyük siyah harfleri kapalı sınıf terimleri olarak kullanacağız. O zaman 20 numaralı sayfadaki tanıma göre

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \text{ denktir } \forall x (x \in \mathbf{A} \Leftrightarrow x \in \mathbf{B}),$$

$$a = \mathbf{B} \text{ denktir } \forall x (x \in a \Leftrightarrow x \in \mathbf{B}),$$

$$\mathbf{B} = a \text{ denktir } a = \mathbf{B}.$$

Sonuç olarak

$$a = \{x : x \in a\}.$$

Yani her küme, bir sınıfa eşittir. Ama tersi yanlıştır; bildiğimiz gibi bazı sınıflar hiçbir kümeye eşit değildir:

**Teorem 6** (Russell Paradoksu [20]).  $\{x : x \notin x\}$  sınıfı, hiçbir kümeye eşit değildir.

*Kanıt.* Bu teoremi zaten 7 numaralı sayfada kanıtladık. Şimdi bir kanıt daha vereceğiz.  $x \notin x$  formülü tarafından tanımlanmış sınıf,  $\mathbf{A}$  olsun. O zaman her  $b$  kümesi için

$$b \in \mathbf{A} \Leftrightarrow b \notin b$$

doğrudur. O zaman  $\forall x (x \in \mathbf{A} \Leftrightarrow x \in b)$  cümlesi yanlıştır. Eşitliğin tanımına göre  $b \neq \mathbf{A}$ .  $\square$

Şimdi sınıf terimlerini  $\in$  işaretinin solunda kullanabiliriz, ama çıkan cümle doğru olacağı için sınıf terimi bir kümeyi adlandırmalı:

$$\mathbf{A} \in \mathbf{B} \text{ denktir } \exists x (x = \mathbf{A} \wedge x \in \mathbf{B}).$$

Eğer  $\forall x (x \in \mathbf{A} \Rightarrow x \in \mathbf{B})$  doğruysa, o zaman  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$  sınıfının **altsınıfıdır** (*subclass*), ve  $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$  ifadesini yazarız. Yani

$$\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \text{ denktir } \forall x (x \in \mathbf{A} \Rightarrow x \in \mathbf{B}).$$

**Teorem 7.**

1. Tüm  $\mathbf{A}$  ile  $\mathbf{B}$  sınıfları için

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \text{ denktir } \mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \wedge \mathbf{B} \subseteq \mathbf{A}.$$

2. Tüm  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{B}$ , ve  $\mathbf{C}$  sınıfları için

$$\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \wedge \mathbf{B} \subseteq \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$$

cümlesi (mantığa göre) doğrudur.

*Alıştırma 3.* Teoremi kanıtlayın.

## 2.5 İşlemler

Sınıflarla birkaç tane ikili işlem vardır. Önce

$$A \cap B = \{x: x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A \cup B = \{x: x \in A \vee x \in B\}.$$

Bunlar sırasıyla  $A$  ile  $B$  sınıflarının **kesişimi** (*intersection*) ve **bileşimi** (*union*).

**Teorem 8.** *Tüm  $A$ ,  $B$ , ve  $C$  sınıfları için*

$$A \cap B = B \cap A,$$

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

*Kanıt.*  $x \in A \wedge x \in B$  denktir  $x \in B \wedge x \in A$ , vesaire. □

Ondan sonra

$$A \setminus B = \{x: x \in A \wedge x \notin B\};$$

bu sınıf,  $A$  sınıfının  $B$  sınıfından **farkıdır** (*difference*). O zaman

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A);$$

bu sınıf,  $A$  ile  $B$  sınıflarının **simetrik farkıdır** (*symmetric difference*).

7 numaralı teorem sayesinde bir  $A \subseteq B \wedge B \subseteq C$  cümlesinin yerine

$$A \subseteq B \subseteq C$$

ifadesini yazabiliriz. Örneğin sonraki teoremi yazabiliriz.

**Teorem 9.** *Tüm  $A$  ile  $B$  sınıfları için*

$$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B,$$

$$A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B.$$

*Alıştırma 4.* Teoremi kanıtlayın.

Sınıflarda bir *birli* işlem vardır:

$$\mathbf{A}^c = \{x : x \notin \mathbf{A}\};$$

bu sınıf,  $\mathbf{A}$  sınıfının **tümleyenidir** (*complement*).

**Teorem 10** (De Morgan Kuralları\*). *Tüm  $\mathbf{A}$  ile  $\mathbf{B}$  sınıfları için*

$$(\mathbf{A} \cap \mathbf{B})^c = \mathbf{A}^c \cup \mathbf{B}^c, \quad (\mathbf{A} \cup \mathbf{B})^c = \mathbf{A}^c \cap \mathbf{B}^c.$$

*Alıştırma 5.* Teoremi kanıtlayın.

İçerilme bağıntısını kullanarak birkaç tane birli işlemi daha tanımlayabiliriz:

$$\bigcap \mathbf{A} = \{x : \forall y (y \in \mathbf{A} \Rightarrow x \in y)\},$$

$$\bigcup \mathbf{A} = \{x : \exists y (x \in y \wedge y \in \mathbf{A})\},$$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathbf{A}) &= \{x : \forall y (y \in x \Rightarrow y \in \mathbf{A})\} \\ &= \{x : x \subseteq \mathbf{A}\}; \end{aligned}$$

bunlar sırasıyla  $\mathbf{A}$  sınıfının **kesişimi** (*intersection*), **bileşimi** (*union*), ve **kuvvet sınıfıdır** (*power class*).

**Teorem 11.** *Eğer  $a \in \mathbf{B}$  ise*

$$\bigcap \mathbf{B} \subseteq a \subseteq \bigcup \mathbf{B}.$$

*Alıştırma 6.* Teoremi kanıtlayın.

Son olarak 8 numaralı sayfadaki gibi

$$\mathbf{V} = \{x : x = x\},$$

---

\*Aslında bu kuralları, Augustus De Morgan'ın (1806–71) eserlerinde bulamadım, ama Venedikli Paulus'un (~1369–1429) eserlerinde [1, 31.35] buldum.

ve

$$\begin{aligned}\emptyset &= \{x: x \neq x\}, \\ \{a\} &= \{x: x = a\}, \\ \{a, b\} &= \{x: x = a \vee x = b\}, \\ \{a, b, c\} &= \{x: x = a \vee x = b \vee x = c\}, \\ &\dots\dots\dots\end{aligned}$$

Buradaki  $\emptyset$  sınıfı, **boş sınıftır**.

**Teorem 12.**

$$\bigcap \emptyset = \mathbf{V}, \quad \bigcup \emptyset = \emptyset.$$

*Alıştırma 7.* Teoremi kanıtlayın.\*

Bu altbölümün

$$\begin{array}{llll} \mathbf{A} \cap \mathbf{B}, & \mathbf{A}^c, & & \emptyset, \\ \mathbf{A} \cup \mathbf{B}, & \bigcap \mathbf{A}, & \mathbf{V}, & \{a\}, \\ \mathbf{A} \triangle \mathbf{B}, & \bigcup \mathbf{A}, & & \{a, b\}, \\ \mathbf{A} \setminus \mathbf{B}, & \mathcal{P}(\mathbf{A}), & & \{a, b, c\} \end{array}$$

ifadeleri, *sınıf* terimidir. Her  $\mathbf{A}$  veya  $\mathbf{B}$  teriminin yerine başka bir terimi koyabiliriz. Zaten bu şekilde  $(\mathbf{A} \setminus \mathbf{B}) \cup (\mathbf{B} \setminus \mathbf{A})$  gibi ifadeleri yazdık. Fakat şimdilik küçük harfler hariç, küme terimlerimiz yoktur. Bu durum hemen değişecek.

---

\*Bazı kitaplarda  $\mathbf{A}$  boş ise  $\bigcap \mathbf{A}$  kesişimi tanımlanmaz. Örneğin [16, s. 51 & 285] kaynağına bakın.

## 3 Doğal Sayılar

### 3.1 Doğal sayılar kümesi

Doğruluğun 17 numaralı sayfadaki tanımına göre  $\exists x x = a$  cümlesi doğru mudur? Yani  $\exists x \forall y (y \in x \Leftrightarrow y \in a)$  cümlesi doğru mudur? Eğer bir  $b$  kümesi için  $b = a$  cümlesi, yani  $\forall y (y \in b \Leftrightarrow y \in a)$  cümlesi, doğruysa, o zaman  $\exists x x = a$  cümlesi de doğrudur. Aslında 4 numaralı teoreme göre  $a = a$  cümlesi doğru, değil mi? O halde  $\exists x x = a$  cümlesi doğru olmalı.

Ama bu iddia pek doğru değildir. Bir  $a$  kümesi varsa, o zaman  $\exists x x = a$  cümlesi doğrudur. Bir küme varsa, bu kümeye  $a$  denilebilir, ve sonuç olarak  $\exists x x = a$  cümlesi doğru oluyor. Bu ana kadar hiç kesin bir kümemiz olmadı. Ama kümeler olmalı, ve birini zaten biliyoruz:

**AKSIYOM 2** (Boş Küme).  $\emptyset$  boş sınıf, bir kümedir:

$$\exists x \forall y (y \notin x)$$

*cümlesi doğrudur.*

Bu aksiyom sayesinde  $\emptyset$  işareti, bir küme terimidir. Bu yüzden  $\{\emptyset\}$  ve  $\{\emptyset, a\}$  gibi sınıf terimlerini yazabiliriz. Bu terimler de, küme terimi olacak. Boş küme gibi bilinen kümelerden yeni kümeler oluşturulabilir:

**AKSIYOM 3** (Bitiştirme). *Tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $a \cup \{b\}$  sınıfı, bir kümedir:*

$$\forall x \forall y \exists z \forall w (w \in z \Leftrightarrow w \in x \vee w = y)$$

*cümlesi doğrudur.*

**Teorem 13** (Temel Kümeler). *Tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $\{a\}$  ile  $\{a, b\}$  sınıfları, kümedir:*

$$\begin{aligned} &\forall x \exists y \forall z (z \in y \Leftrightarrow z = x), \\ &\forall x \forall y \exists z \forall w (w \in z \Leftrightarrow w = x \vee w = y) \end{aligned}$$



cümleleri doğrudur.

*Kanıt.* Boş Küme ile Bitiştirme Aksiyomlarına göre  $\{a\}$  sınıfı,  $\emptyset \cup \{a\}$  kümesine eşittir, ve  $\{a, b\}$  sınıfı,  $\{a\} \cup \{b\}$  kümesine eşittir.  $\square$

Özel olarak her  $a$  kümesi için  $a \cup \{a\}$  bir kümedir. Bu son küme,  $a'$  olsun. Yani her  $a$  kümesi için

$$a' = a \cup \{a\}$$

olsun.  $a'$  kümesi,  $a$  kümesinin **ardılıdır** (*successor*). Sık sık ardılları alarak

$$\emptyset, \quad \emptyset', \quad \emptyset'', \quad \emptyset''', \quad \dots$$

küme dizisini oluşturabiliriz. Bu dizi,

$$\emptyset, \quad \{\emptyset\}, \quad \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \quad \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \quad \dots$$

Yukarıdaki 5 numaralı sayfadaki gibi bu kümeler,

$$0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad \dots$$

doğal sayıları olacak. Elemanları *tüm* doğal sayılar olan bir sınıf var mıdır?

Doğal sayıların *topluluğunun* iki özelliği vardır:

1. 0, bu topluluktur.
2. Eğer  $a$ , bu topluluktaysa,  $a \cup \{a\}$  kümesi de, bu topluluktur.

Bu özellikleri olan *kümeler*, bir sınıf oluşturur. Yani

$$\Omega = \{x : 0 \in x \wedge \forall y (y \in x \Rightarrow y \cup \{y\} \in x)\}$$

eşitliğini sağlayan bir  $\Omega$  sınıfı vardır.

**Teorem 14.**

1.  $0 \in \bigcap \Omega$ .
2. Eğer  $a \in \bigcap \Omega$  ise, o zaman  $a \cup \{a\} \in \bigcap \Omega$ .

3. Eğer  $a \subseteq \bigcap \Omega$  ise, ve  $a$ ,

$$0 \in a, \quad \forall x (x \in a \Rightarrow x \cup \{x\} \in a)$$

özelliklerini sağlarsa, o zaman  $a = \bigcap \Omega$ .

*Kanıt.* 1. Eğer  $a \in \Omega$  ise, o zaman  $0 \in a$ . Sonuç olarak  $0 \in \bigcap \Omega$ .

2.  $a \in \bigcap \Omega$  olsun. O zaman  $\Omega$  sınıfının her  $b$  elemanı için  $a \in b$ . Ayrıca  $b \in \Omega$  yüzünden  $\forall y (y \in b \Rightarrow y \cup \{y\} \in b)$  cümlesi doğrudur. O zaman  $a \cup \{a\} \in b$  olmalı. Sonuç olarak  $a \cup \{a\} \in \bigcap \Omega$ .

3.  $0 \in a$  ve  $\forall x (x \in a \Rightarrow x \cup \{x\} \in a)$  doğru olsun. O zaman  $a \in \Omega$ . Bu yüzden 11 numaralı teoreme göre  $\bigcap \Omega \subseteq a$  olmalı. Eğer ayrıca  $a \subseteq \bigcap \Omega$  ise, o zaman 7 numaralı teoreme göre  $a = \bigcap \Omega$ .  $\square$

Bu teoreme rağmen eğer

$$\mathbf{A} \subseteq \bigcap \Omega, \quad 0 \in \mathbf{A}, \quad \forall x (x \in \mathbf{A} \Rightarrow x \cup \{x\} \in \mathbf{A}) \quad (*)$$

ise  $\mathbf{A} = \bigcap \Omega$  cümlesini sonuçlandıramıyoruz. Neden? Çünkü 12 numaralı teoreme göre

$$\bigcap 0 = \mathbf{V}$$

(yani  $\bigcap \emptyset = \mathbf{V}$ ), ve  $\Omega$  sınıfının boş olmadığını şimdilik bilmiyoruz. Bu durumu hemen değiştirebiliriz:

**AKSİYOM 4** (Sonsuzluk).  $\Omega \neq 0$ , yani

$$\exists x (0 \in x \wedge \forall y (y \in x \Rightarrow y \cup \{y\} \in x))$$

cümlesi doğrudur.

Hâlâ yukarıdaki (\*) satırındaki varsayılarından  $\mathbf{A} = \bigcap \Omega$  cümlesini sonuçlandıramıyoruz. Neden? Bir tane aksiyomu daha kullanarak bunu sonuçlandırabiliriz:

**AKSİYOM 5** (Ayrırma). Bir kümenin her alt sınıfı, bir kümedir, yani her  $\varphi(x)$  formülü için

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \Leftrightarrow z \in x \wedge \varphi(z))$$

cümlesi doğrudur.

Şimdi her  $a$  kümesi ve  $\varphi(x)$  formülü için  $\{x: x \in a \wedge \varphi(x)\}$  sınıfı, bir kümedir, ve bu küme

$$\{x \in a: \varphi(x)\}$$

olarak yazılır.

**Teorem 15.** *Bir sınıf boş değilse, kesişimi bir kümedir.*

*Kanıt.*  $a \in \mathbf{B}$  olsun. 11 numaralı teoreme göre  $\bigcap \mathbf{B} \subseteq a$ . Ayırma Aksiyomuna göre  $\bigcap \mathbf{B}$  kesişimi, bir küme olmalı.  $\square$

Özel olarak

$$\omega = \bigcap \Omega$$

eşitliğini sağlayan bir  $\omega$  kümesi vardır. Bu kümenin elemanları, **von Neumann doğal sayılarıdır**.  $\omega$  işareti, yeni bir küme terimidir. Bundan sonra  $\Omega$  sınıf terimini kullanmayacağız.

Şimdi 14 numaralı teoremi aşağıdaki biçimde yazabiliriz:

1.  $0 \in \omega$ .
2. Eğer  $a \in \omega$  ise, o zaman  $a' \in \omega$ .
3. Eğer  $a \subseteq \omega$  ise, ve  $a$ ,

$$0 \in a, \quad \forall x (x \in a \Rightarrow x' \in a)$$

özelliklerini sağlarsa, o zaman  $a = \omega$ .

Ayrıca her kümenininki gibi  $\omega$  kümesinin de her alt sınıfı, bir kümedir. Sonuç olarak  $\omega$  kümesinin bazı özelliklerini **tümevarım** (*induction*) yöntemiyle kanıtlayabileceğiz.

Aslında bazen  $\omega$  kümesinin iki özelliğininin daha kullanılması gerekecek.  $\forall x x' \neq 0$  apaçıktır. Ama  $k$  ile  $m$ , doğal sayılar ise, ve  $k' = m'$  ise,  $k = m$  eşitliğini elde etmek, biraz daha zor olacak.

Mümkünse  $k' = m'$  ama  $k \neq m$  olsun. O zaman  $k \in m$  ve  $m \in k$  olmalı. Bundan  $k \in k$  cümlesini sonuçlandırmak istiyoruz.

Eğer bir  $\mathbf{A}$  sınıfı,

$$\forall x \forall y (x \in \mathbf{A} \wedge y \in x \Rightarrow y \in \mathbf{A})$$

cümlesini sağlarsa, o zaman  $\mathbf{A}$  sınıfına **geçişli** (*transitive*) denir. Öyleyse her geçişli sınıfın her elemanı, sınıfın bir altkümesidir de.

**Teorem 16.**  $\omega$  kümesinin her elemanı, geçişlidir.

*Kanıt.*  $a$ ,  $\omega$  kümesinin geçişli elemanları kümesi olsun. Yani

$$\begin{aligned} a &= \{x \in \omega : \forall y \forall z (y \in x \wedge z \in y \Rightarrow z \in x)\} \\ &= \{x \in \omega : \forall y (y \in x \Rightarrow y \subseteq x)\} \end{aligned}$$

olsun. O zaman  $0 \in a$ . *Tümevarım hipotezi* olarak  $b \in a$  olsun.  $b' \in a$  cümlesinin doğruluğunu göstereceğiz.  $c \in b'$  olsun. Ya  $c \in b$  ya da  $c = b$ . Eğer  $c \in b$  ise, o zaman hipotezimize göre  $c \subseteq b$ . Her durumda  $b \subseteq b'$ . Öyleyse  $c \subseteq b'$ . Ama  $c, b'$  kümesinin herhangi bir elemanıdır. Sonuç olarak  $b' \in a$ . Tümevarımdan (yani 14 numaralı teoremin 31 numaralı sayfadaki biçiminden)  $a = \omega$ .  $\square$

**Teorem 17.**  $\omega$  kümesi, geçişlidir.

*Alıştırma 8.* Teoremi kanıtlayın.

*Alıştırma 9.*  $\{0, 1, \{1\}\}$  kümesinin geçişli olduğunu kanıtlayın.

**Teorem 18.**  $\omega$  kümesinin hiçbir elemanı, kendisini içermez.

*Kanıt.* Tekrar tümevarımı kullanacağız. Çünkü boş kümenin hiçbir elemanı yok,  $0 \notin 0$ . Şimdi  $a \in \omega$  ve  $a \notin a$  olsun. Eğer  $a' \in a'$  ise, ya  $a' \in a$  ya da  $a' = a$ . Her durumda, geçen teoreme göre,  $a' \subseteq a$ , dolayısıyla  $a \in a$  (çünkü  $a \in a'$ ). Bu sonuç, varsayımımızla çelişir. O zaman  $a' \notin a'$  olmalı. Tümevarımdan kanıtımız bitti.  $\square$

**Teorem 19.**  $\omega$  kümesinin tüm  $k$  ile  $m$  elemanları için  $k' = m'$  ise  $k = m$ .

*Kanıt.* Mümkünse  $k' = m'$  ama  $k \neq m$  olsun. Dedğimiz gibi  $k \in m$  ve  $m \in k$  olmalı. 16 ile 18 numaralı teoremlere göre  $k \in k$  ve  $k \notin k$ , bir çelişkidir.  $\square$

Şimdi, 14 numaralı teoremdelikler dahil,  $\omega$  kümesinin beş tane özelliği vardır:

1.  $0 \in \omega$ .
2.  $\forall x (x \in \omega \Rightarrow x' \in \omega)$ .
3.  $\forall x (x \subseteq \omega \wedge 0 \in x \wedge \forall y (y \in x \Rightarrow y' \in x) \Rightarrow x = \omega)$ .
4.  $\forall x (x \in \omega \Rightarrow x' \neq 0)$ .
5.  $\forall x \forall y (x \in \omega \wedge y \in \omega \wedge x' = y' \Rightarrow x = y)$ .

Bu özelliklerin önemi, 1887 yılında Dedekind [6, II, ¶71] tarafından, ve 1889 yılında Peano [17] tarafından, fark edilmiştir. Sık sık **Peano Aksiyomları**, bu özelliklere denir, ama **Dedekind–Peano Aksiyomları** de kullanılabilir. Aslında bizim için aksiyomlar değil, teoremdirler.

Peano Aksiyomlarından doğal sayıların tüm özellikleri elde edilebilir. Mesela *iyi sıralama* özelliği elde edilebilir. Aslında  $\omega$ , içerilme ( $\in$ ) bağıntısı tarafından iyi sıralanır. Ama bir bağıntı nedir?

## 3.2 Bağıntılar

Herhangi  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $\{\{a\}, \{a, b\}\}$  kümesi  $(a, b)$  **sıralı ikilisi** (*ordered pair*) olarak yazılır. Yani\*

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

**Teorem 20.** *Tüm  $a, b, c$ , ve  $d$  kümeleri için*

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

*cümlesi doğrudur.*

**Alıştırma 10.** Teoremi kanıtlayın.

**Alıştırma 11.**  $\{\{a, 1\}, \{b, 2\}\} = \{\{c, 1\}, \{d, 2\}\} \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$  cümlesini kanıtlayın.<sup>†</sup>

---

\* \* numaralı sayfadaki notta dediğimiz gibi bu tanım, Kuratowski'nin [12] 1921 yılında verdiği tanımdır.

<sup>†</sup> Heijenoort'a [25, s. 224] göre bu cümlede, Hausdorff'un 1914 yılında verdiği sıralı ikili tanım bulunmuştur.

*Alıştırma 12.*  $\{\{\{a\}, 0\}, \{\{b\}\}\} = \{\{\{c\}, 0\}, \{\{d\}\}\} \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$  cümlesini kanıtlayın.\*

Şimdi her ikili  $\varphi(x, y)$  formülü için

$$\{z: \exists x \exists y (z = (x, y) \wedge \varphi(x, y))\}$$

sınıfı,

$$\{(x, y): \varphi(x, y)\}$$

olarak yazılabilir. Öyle bir sınıf, bir **ikili bağıntıdır** (*binary relation*).

Örneğin:

1. İçerilme bağıntısı,  $\{(x, y): x \in y\}$  sınıfıdır.
2. Eşitlik bağıntısı,  $\{(x, y): x = y\}$  sınıfıdır.

Aynı şekilde, eğer  $\mathbf{R}$ , bir ikili bağıntıysa, o zaman  $(x, y) \in \mathbf{R}$  formülünün kısaltması olarak  $x \mathbf{R} y$  ifadesini yazarız, yani

$$x \mathbf{R} y \text{ denktir } (x, y) \in \mathbf{R}.$$

$\mathbf{R}$  bağıntısının **ters bağıntısı** veya **tersi** (*converse*),

$$\{(y, x): x \mathbf{R} y\}$$

bağıntısıdır. Bu bağıntı,  $\check{\mathbf{R}}$  olarak yazılır; yani

$$x \check{\mathbf{R}} y \text{ denktir } y \mathbf{R} x.$$

$\mathbf{A}$  ile  $\mathbf{B}$ , iki sınıf ise, o zaman tanıma göre

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \{(x, y): x \in \mathbf{A} \wedge y \in \mathbf{B}\};$$

bu bağıntı,  $\mathbf{A}$  ile  $\mathbf{B}$  sınıflarının **çarpımıdır** (*product*). Eğer  $\mathbf{R} \subseteq \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ , o zaman  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{A}$  sınıfından  $\mathbf{B}$  sınıfına giden bir bağıntıdır.

Sınıflar arasındaki bir bağıntının kendisi, bir sınıftır. Sıralı ikililerin tanımını, sınıflarla bağıntıları birleştirir. Benzer şekilde Newton'un Ağırlık

---

\*Bu cümlede, Wiener'in [27] 1914 yılında verdiği sıralı ikili tanım bulunmuştur.

Kanunu, Ay'ın Yerin etrafında dönüşü ile nesnelere yere düşüşünü birleştirir.

Eğer  $F$ ,

$$\forall x \forall y \forall z (x \mathbf{F} y \wedge x \mathbf{F} z \Rightarrow y = z) \quad (\dagger)$$

cümlesini sağlayan bir ikili bağıntıysa, o zaman

- (1)  $F$  bağıntısına **gönderme** denir;
- (2)  $\{x: \exists y x \mathbf{F} y\}$  sınıfına  $F$  göndermesinin **tanım sınıfı** (*domain*) denir;
- (3)  $\{y: \exists x x \mathbf{F} y\}$  sınıfına  $F$  göndermesinin **değer sınıfı** (*range*) denir.\*

Bu durumda  $x \mathbf{F} y$  formülünün yerine

$$y = \mathbf{F}(x)$$

ifadesini yazarız, çünkü  $a \mathbf{F} b$  doğruysa, o zaman  $b$  kümesi,  $a$  kümesi tarafından belirtilir. Buradaki  $\mathbf{F}(x)$  ifadesi, yeni bir küme terimidir. O zaman  $F$ ,

$$x \mapsto \mathbf{F}(x)$$

olarak yazılabilir; yani

$$(x \mapsto \mathbf{F}(x)) = \{(x, y): y = \mathbf{F}(x)\}.$$

Örneğin:

1. Her  $a$  kümesi için,  $x \mapsto a$  **sabit gönderme** (*constant function*) vardır, özel olarak  $x \mapsto 0$ ,  $x \mapsto 1$ ,  $\dots$ ,  $x \mapsto \omega$ ,  $\dots$
2.  $x \mapsto x$ , **özdeşlik göndermesidir** (*identity function*).
3.  $x \mapsto x'$ , **ardıl göndermesi** (*successor function*) veya **ardıllamadır** (*succession*).

---

\*Bu notlarda bir gönderme, sadece  $(\dagger)$  cümlesini sağlayan bir  $F$  ikili bağıntısıdır. Fakat bazı kaynaklarda (örneğin [16, s. 70] kaynağında) bir gönderme veya fonksiyon, (1)  $(\dagger)$  cümlesini sağlayan bir  $F$  ikili bağıntısı, (2)  $\{y: \exists x x \mathbf{F} y\}$  sınıfına eşit bir  $A$  sınıfı, ve (3)  $\{y: \exists x x \mathbf{F} y\}$  sınıfını kapsayan bir  $B$  sınıfı tarafından oluşturulmuş bir üçlüdür. O halde (aşağıdaki 36 numaralı sayfadaki gibi)  $F: A \rightarrow B$  ifadesi yazılır. Ayrıca,  $B$  sınıfına *göndermenin değer sınıfı* (veya *varış sınıfı*) denilebilir. İngilizcede *codomain* kullanılır. Ama buradaki  $B$  sınıfı, sadece  $F$  sınıfı tarafından belirtilmez, ve buna hiçbir ad vermiyoruz.

Eğer  $F$  göndermesinin tanım sınıfı  $A$  ise, ve değer sınıfını, bir  $B$  sınıfı tarafından kapsarırsa, o zaman

$$F: A \rightarrow B$$

ifadesini yazarız. Yani bu ifade,

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (x F y \Rightarrow x \in A \wedge y \in B) \\ \wedge \forall x (x \in A \Rightarrow \exists y (x F y)) \\ \wedge \forall x \forall y \forall z (x F y \wedge x F z \Rightarrow y = z) \end{aligned}$$

cümlesinin kısaltmasıdır.

### 3.3 Sıralamalar

**Sıralama** (*ordering*),

$$\forall x \neg x R x, \quad \forall x \forall y \forall z (x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z)$$

cümlelerini sağlayan bir  $R$  ikili bağıntısıdır. Örneğin yukarıdaki 13 numaralı sayfada bahsedildiği ve aşağıdaki 73 numaralı sayfada kanıtlanacak Schröder–Bernstein Teoremine göre  $\prec$  bağıntısı, bir sıralama olacaktır. Ayrıca

$$A \subset B \text{ denktir } A \subseteq B \wedge A \neq B$$

olsun; o zaman  $\subset$  bağıntısı da, bir sıralamadır.

Belki bir  $R$  bağıntısı, bir sıralama değildir, ama bir  $A$  sınıfı için

$$R \cap (A \times A)$$

kesişimi, bir sıralama olabilir. O zaman  $A$ ,  $R$  tarafından sıralanır. Örneğin  $\in$ , sıralama değil; ama 16 ile 18 numaralı teoremlere göre  $\in$  bağıntısı  $\omega$  kümesini sıralar.

Eğer  $A$  sınıfı,  $R$  tarafından sıralanırsa, ve üstelik

$$\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y \Rightarrow x R y \vee y R x)$$

doğruysa, o zaman  $R$ ,  $A$  sınıfının bir **doğrusal** (*linear*) sıralamasıdır.



**Teorem 21.**  $\in$  bağıntısı, her doğal sayının doğrusal sıralamasıdır.

*Alıştırma 13.* Teoremi kanıtlayın.

Eğer  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{A}$  sınıfının doğrusal sıralamasıysa, ve üstelik  $\mathbf{A}$  sınıfının her boş olmayan  $b$  altkümesinin  $\mathbf{R}$  sıralamasına göre **en küçük** (*least*) elemanı varsa, yani

$$\forall x \left( x \subseteq \mathbf{A} \wedge x \neq 0 \Rightarrow \exists y \left( y \in x \wedge \forall z \left( z \in x \setminus \{y\} \Rightarrow y \mathbf{R} z \right) \right) \right)$$

doğruysa, o zaman  $\mathbf{A}$ ,  $\mathbf{R}$  tarafından **iyi sıralanır** (*well-ordered*).

**Teorem 22.**  $\in$  bağıntısı, her doğal sayının iyi sıralamasıdır.

*Alıştırma 14.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 23.**  $\omega$  kümesinde  $\in$  ile  $\subset$ , aynı bağıntıdır, yani

$$\forall x \forall y \left( x \in \omega \wedge y \in \omega \Rightarrow (x \in y \Leftrightarrow x \subset y) \right)$$

*doğrudur.*

*Kanıt.*  $k$  ile  $m$ , doğal sayılar olsun. 16 ile 18 numaralı teoremlere göre  $k \in m$  ise  $k \subset m$ .

Şimdi  $k \subset m$  olsun. Önceki teoreme göre  $m \setminus k$  farkının en küçük  $\ell$  elemanı vardır. O zaman  $\ell \in m$ , dolayısıyla  $\ell \subseteq m$ . Ayrıca  $a \in \ell$  ise  $a \in k$  olmalı (çünkü  $a \in m$ , ama içerilmeye göre  $\ell$ ,  $m \setminus k$  farkının en küçük elemanıdır). Öyleyse  $\ell \subseteq k$ . Ama  $b \in k$  ise  $b \in m$ , dolayısıyla  $\ell \in b$  veya  $\ell = b$  veya  $b \in \ell$ . Ancak  $\ell \notin b$  ve  $\ell \neq b$  (çünkü  $b \subseteq k$  ve  $\ell \notin k$ ). Öyleyse  $b \in \ell$ . Sonuç olarak  $k \subseteq \ell$ . Fakat  $\ell \subseteq k$ . O zaman  $k = \ell$ , dolayısıyla  $k \in m$ .  $\square$

**Teorem 24.**  $\omega$ , içerilme tarafından iyi sıralanır.

*Kanıt.*  $\omega$  kümesinde  $m \notin k$  ve  $m \neq k$  olsun. Yani (önceki teoremi kullanarak)  $m \not\subseteq k$  olsun. O zaman  $m \setminus k$  farkının en küçük  $\ell$  elemanı vardır. Geçen kanıttaki gibi  $\ell \subseteq k$ , yani  $\ell \in k$  veya  $\ell = k$ . Fakat  $\ell \notin k$ . Sonuç olarak  $\ell = k$ , dolayısıyla  $k \in m$ . Öyleyse içerilme,  $\omega$  kümesinin bir doğrusal sıralamasıdır.

Ayrıca  $a \subseteq \omega$  ve  $n \in a$  ise, ya  $n$   $a$  kümesinin en küçük elemanıdır, ya da  $n \cap a$  kesişimi boş değildir. Son durumda bu kesişimin en küçük elemanı vardır, ve bu eleman,  $a$  kümesinin en küçük elemanıdır.  $\square$

### 3.4 Ordinaler

Önceki iki teoremin kanıtları, doğal sayıların sadece geçişlilik ve iyi sıralama özelliklerini kullanmaktadır. Bir **ordinal**,

- 1) geçişli ve
- 2)  $\in$  tarafından iyi sıralanmış

bir kümedir. Ordinaler,

**ON**

sınıfını oluşturur. O zaman 16 ve 22 numaralı teoremlere göre

$$\omega \subseteq \mathbf{ON}.$$

Üstelik 17 ve 24 numaralı teoremlere göre

$$\omega \in \mathbf{ON}.$$

Dolayısıyla  $\omega' \in \mathbf{ON}$ .

**Teorem 25.** *Her ordinalin ardılı, bir ordinaldir.*

*Alıştırma 15.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 26.** **ON** sınıfında  $\in$  ve  $\subset$ , aynı bağıntıdır.

*Alıştırma 16.* 23 numaralı teoremin kanıtını kullanarak bu teoremi kanıtlayın.

**Teorem 27** (Burali-Forti Paradoksu [3]). **ON** geçişlidir, ve  $\in$  tarafından iyi sıralanır.

*Kanıt.*  $\alpha$  bir ordinal olsun, ve  $\beta \in \alpha$  olsun. O zaman  $\beta \subseteq \alpha$ . Bu durumda  $\beta$ ,  $\in$  tarafından iyi sıralanır. Şimdi  $\gamma \in \beta$  olsun. O zaman  $\gamma \in \alpha$ , dolayısıyla  $\gamma \subseteq \alpha$ . O zaman  $\delta \in \gamma$  ise  $\delta \in \alpha$ .  $\alpha$ ,  $\in$  tarafından iyi sıralandığından,  $\delta \in \beta$ , çünkü  $\beta$ ,  $\gamma$ , ve  $\delta$ , hepsi  $\alpha$  kümesindedir, ve  $\delta \in \gamma$ , ve  $\gamma \in \beta$ . Kısaca  $\delta \in \gamma \Rightarrow \delta \in \beta$ , yani  $\gamma \subseteq \beta$ . Ama  $\gamma, \beta$  kümesinin herhangi bir elemanıdır.

Öyleyse  $\beta$ , geçişlidir. Sonuç olarak  $\beta$ , bir ordinaldir. Ama  $\beta$ ,  $\alpha$  ordinalinin herhangi bir elemanıdır. O zaman  $\alpha \subseteq \mathbf{ON}$ . Ve  $\alpha$ , herhangi bir ordinaldir. Öyleyse  $\mathbf{ON}$  geçişlidir.

Ordinaler sınıfının  $\in$  tarafından iyi sıralandığı kanıt, 24 numaralı teoremin kanıtı ile aynıdır.  $\square$

9 numaralı sayfada dediğimiz gibi  $\mathbf{ON}$  bir küme olsaydı,  $\mathbf{ON} \in \mathbf{ON}$ , ki bu saçmadır (çünkü  $\mathbf{ON}$  sınıfında  $\in$  dönüşüzdür).

$\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\theta$ , ve  $\iota$  küçük Yunan harfleri, her zaman *ordinal* sabit olacaktır. Yani

$$\alpha \in \mathbf{ON},$$

vesaire. Ayrıca 26 numaralı teorem sayesinde  $\alpha \in \beta$  veya  $\alpha \subset \beta$  formülünün yerine

$$\alpha < \beta$$

ifadesini yazabiliriz.  $\xi$  Yunan harfi, ordinal değişken olacaktır. Özel olarak

$$\{\xi : \pi(\xi)\} = \{x : x \in \mathbf{ON} \wedge \varphi(x)\}.$$

**Teorem 28.**  $\alpha' = \min\{\xi : \alpha < \xi\}$ , yani her ordinal için daha büyük ordinaler sınıfının en küçük elemanı, ordinalin ardıdır.

*Alıştırma 17.* Teoremi kanıtlayın.

Eğer  $\alpha$  boş veya ardıl değilse, ve  $\beta \in \alpha$  ise, o zaman  $\beta' < \alpha$  olmalıdır. Bu durumda,  $\alpha$  ordinaline **limit** denir. Örneğin  $\omega$ , bir limittir.

**Teorem 29.**  $\omega$ , hem limit olmayan hem limit içermeyen ordinaler sınıfıdır. Yani

$$\omega = \{\xi : (\xi = 0 \vee \exists y y' = \xi) \wedge \forall z (z \in \xi \Rightarrow z = 0 \vee \exists y y' = z)\}. \quad (\ddagger)$$

*Kanıt.* Tümevarımla her doğal sayı, ne limittir ne limit içerir. Öte yandan, eğer  $\alpha'$  ardıl, hiç limit içermezse, o zaman  $\alpha$  ordinal de, hiç limit içermez. Öyleyse en küçük limit olmayan, limit içermeyen, doğal sayı olmayan ordinal yoktur. O zaman hiç öyle ordinaler yoktur.  $\square$

Bu teoremin kanıtı, Sonsuzluk Aksiyomunu kullanmaz, dolayısıyla  $(\ddagger)$  eşitliği,  $\omega$  sınıfının tanımı olarak kullanılabilir. O halde 33 numaralı sayfadaki Peano Aksiyomları yeniden kanıtlanmalıdır.

### 3.5 Özyineleme

$\omega$  kümesinde toplama, bir **ikili işlem** olacak, yani  $\omega \times \omega$  çarpımından  $\omega$  kümesine giden bir gönderme. Bu işlem,

$$(x, y) \mapsto x + y$$

olarak yazılır. O zaman her  $k$  doğal sayısı için bir  $x \mapsto k + x$  **birli işlemi** olacaktır. Bu işlemin özelliklerinden ikisi,

$$k + 0 = k, \quad \forall x (x \in \omega \Rightarrow k + x' = (k + x)') \quad (§)$$

olacaktır. Aslında  $\omega$  kümesindeki birli işlemlerden en çok birinin bu özellikleri vardır. Çünkü  $f: \omega \rightarrow \omega$ ,  $f(0) = k$ , ve  $\forall x (x \in \omega \Rightarrow f(x') = f(x)')$  olsun. O zaman  $f(0) = k + 0$ , ve  $f(m) = k + m$  ise  $f(m') = f(m)' = (k + m)' = k + m'$ . Tümevarımla her  $n$  doğal sayısı için  $f(n) = k + n$ .

Neden  $\omega$  kümesindeki birli işlemlerden *en az* birinin (§) satırındaki özellikleri vardır?  $k = 0$  durumunda her  $n$  için  $k + n = n$  olsun. O zaman  $k + 0 = 0$ , ve  $k + m' = m' = (k + m)'$ . Üstelik  $k = \ell$  durumunda (§) satırındaki gibi  $x \mapsto k + x$  işlemi varsa  $\ell' + n = (\ell + n)'$  olsun. O zaman  $\ell' + 0 = (\ell + 0)' = \ell'$ , ve  $\ell' + m' = (\ell + m)'' = (\ell' + m)'$ . Yani  $k = \ell'$  durumunda (§) satırındaki gibi  $x \mapsto k + x$  işlemi vardır.

Tümevarımla  $\omega$  kümesindeki her  $k$  için (§) satırındaki gibi  $x \mapsto k + x$  işleminin olduğu sonucuna varabilir miyiz? Tümevarımla bir *kümenin*  $\omega$  kümesine eşit olduğu kanıtlanabilir. Şimdiki durumda hangi küme,  $\omega$  kümesine eşit olmalıdır? Mümkünse  $a$ ,  $\omega$  kümesinin öyle  $k$  elemanları tarafından oluşturulsun ki (§) satırındaki özelliklerini sağlayan bir işlem olsun. O halde gösterdiğimiz gibi  $a = \omega$  olmalıdır. Ama öyle bir  $a$  kümesi var mıdır? Hangi formül, bu kümeyi tanımlayabilir?

8 ve 46 numaralı sayfalardaki Yerleştirme Aksiyomuna göre bir kümede birli bir işlemin kendisi, bir kümedir. O halde istediğimiz  $a$  kümesi tanımlanabilir, dolayısıyla  $\omega$  kümesindeki toplamının kendisi tanımlanabilir. Aslında (§) satırındaki özellikleri, toplamının **özyineli tanımını** (*recursive definition*) sağlar.

Benzer şekilde her  $k$  doğal sayısı için

$$k \cdot 0 = 0, \quad \forall x (x \in \omega \Rightarrow k \cdot x' = k \cdot x + k) \quad (\heartsuit)$$

özellikleri olan  $x \mapsto k \cdot x$  işlemi vardır. (Burada tabii ki  $k \cdot x + k = (k \cdot x) + k$ .) Çünkü  $0 \cdot n = 0$  ise  $0 \cdot 0 = 0$  ve  $0 \cdot m' = 0 = 0 + 0 = 0 \cdot m + 0$ . Ayrıca istediğimiz gibi  $x \mapsto \ell \cdot x$  varsa  $\ell' \cdot n = \ell \cdot n + n$  olsun. O halde

$$\begin{aligned} \ell' \cdot m' &= \ell \cdot m' + m' \\ &= (\ell \cdot m + \ell) + m' \\ &= \ell \cdot m + (\ell + m') \\ &= \ell \cdot m + (\ell + m)' \\ &= \ell \cdot m + (m + \ell)' \\ &= \ell \cdot m + (m + \ell') \\ &= (\ell \cdot m + m) + \ell' \\ &= \ell' \cdot m + \ell'. \end{aligned}$$

Ama burada toplamamanın birleşme ve değişme özelliklerini kullandık; bunlar kanıtlanmalıdır.

Buraya kadar gelmek için tümevarım yeter. Yani 33 numaralı sayfadaki ilk üç Peano Aksiyomu yeter. Sayılar teorisinde, her pozitif  $n$  modülüse göre tamsayılar, bu aksiyomları sağlar. Yani eğer bir  $a$  kümesinin elemanları tamsayı ise, ve

$$x \equiv 0 \pmod{n}$$

denkliğinin  $a$  kümesinden çözümü varsa, ve ayrıca her  $\ell$  tamsayısı için

$$x \equiv \ell \Rightarrow y \equiv \ell' \pmod{n}$$

karıştırmasının  $a$  kümesinden çözümü varsa, o zaman her  $k$  tamsayısı için

$$x \equiv k \pmod{n}$$

denkliğinin  $a$  kümesinden çözümü vardır. Örneğin  $p$ , bir asal sayı olsun. O zaman

$$0^p \equiv 0 \pmod{p},$$

ve

$$a^p \equiv a \Rightarrow (a + 1)^p \equiv a + 1 \pmod{p},$$

çünkü

$$\begin{aligned}(a+1)^p &\equiv a^p + pa^{p-1} + \binom{p}{2}a^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-2}a^2 + pa + 1 \\ &\equiv a^p + 1 \pmod{p}.\end{aligned}$$

Sonuç olarak Fermat'ın Teoremi doğrudur, yani her  $p$  asal sayısı için, her  $a$  tamsayısı için\*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Aynı sebeple tüm  $a, b, c$ , ve  $d$  tamsayıları için, her pozitif  $n$  sayısı için

$$a \equiv b \wedge c \equiv d \Rightarrow a + c \equiv b + d \wedge a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}.$$

Sadece tümevarımı kullanarak  $(x, y) \mapsto x^y$  ikili üstel işlemi tanımlanabilir mi? Özyineli tanım varsa  $\omega$  kümesindeki her  $k$  için

$$k^0 = 1, \quad \forall x (x \in \omega \Rightarrow k^{x'} = k^x \cdot k). \quad (||)$$

Özel olarak  $0^0 = 1$ , ama  $n > 0$  ise  $0^n = 0$ . Öyleyse  $0 \equiv n$  ama  $0^0 \not\equiv 0^n \pmod{n}$ . Üstel işlem için tümevarım yetmez.<sup>†</sup>

**Teorem 30** (Özyineleme [Recursion]).  $\mathbf{A}$ , bir sınıf olsun, ve  $b \in \mathbf{A}$  ile  $\mathbf{F}: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$  olsun.  $O$  zaman  $\omega$  kümesinden  $\mathbf{A}$  sınıfına giden

$$\mathbf{G}(0) = b, \quad \forall x (x \in \omega \Rightarrow \mathbf{G}(x') = \mathbf{F}(\mathbf{G}(x)))$$

özellikleri olan bir ve tek bir  $\mathbf{G}$  göndermesi vardır.

*Kanıt.* Tümevarımla en çok bir  $\mathbf{G}$  göndermesi vardır. En az biri varsa, bağıntı olarak,  $\omega \times \mathbf{A}$  çarpımının alt sınıfıdır, ve her  $(\ell, d)$  elemanı için,

- ya  $(\ell, d) = (0, b)$ ,
- ya da bir  $(k, c)$  elemanı için,  $k' = \ell$  ve  $\mathbf{F}(c) = d$ .

\*Gauss'a [8, ¶50] göre verdiğimiz kanıt, Euler'indir.

†[18] makalesine bakın.

Bu özelliği olan kümeler vardır, mesela

$$\{(0, b)\}, \{(0, b), (1, \mathbf{F}(b))\}, \{(0, b), (1, \mathbf{F}(b)), (2, \mathbf{F}(\mathbf{F}(b)))\}, \dots$$

Özelliği olan kümelerin oluşturduğu sınıf,  $\mathcal{C}$  olsun. O zaman  $\bigcup \mathcal{C}$ , istediğimiz  $\mathbf{G}$  göndermesi olacaktır. Bunu göstermek için, tüm Peano Aksiyomları kullanılmalıdır.

Hemen  $\{(0, b)\} \in \mathcal{C}$ , dolayısıyla  $(0, b) \in \bigcup \mathcal{C}$ . Şimdi  $(k, c) \in \bigcup \mathcal{C}$  varsayalım. O zaman  $\mathcal{C}$  sınıfının bir  $a$  elemanı için  $(k, c) \in a$ . O halde  $a \cup \{(k', \mathbf{F}(c))\} \in \mathcal{C}$ . Böylece  $(k', \mathbf{F}(c)) \in \bigcup \mathcal{C}$ . Tümevarımla her  $k$  doğal sayısı için  $\mathbf{A}$  sınıfının  $(k, c) \in \bigcup \mathcal{C}$  içerilmesini sağlayan  $c$  elemanı vardır, yani

$$\{x: \exists y (x, y) \in \bigcup \mathcal{C}\} = \omega.$$

Şimdi

$$\{x: \forall y \forall z ((x, y) \in \bigcup \mathcal{C} \wedge (x, z) \in \bigcup \mathcal{C} \Rightarrow y = z)\} = \omega$$

eşitliğini kanıtlayacağız. Soldaki küme,  $a_0$  olsun. Eğer  $(0, e) \in \bigcup \mathcal{C}$  ise, o zaman  $\mathcal{C}$  sınıfının bir  $a$  elemanı için  $(0, e) \in a$ , dolayısıyla  $e = b$  olmalıdır, çünkü 0, ardıl değildir. Öyleyse  $0 \in a_0$ . Şimdi  $k \in a_0$  olsun. Gösterdiğimiz gibi  $\mathbf{A}$  sınıfının bir  $c$  elemanı için  $(k, c) \in \bigcup \mathcal{C}$  ve  $(k', \mathbf{F}(c)) \in \bigcup \mathcal{C}$ .  $(k', d) \in \bigcup \mathcal{C}$  varsayalım. O zaman  $\mathcal{C}$  sınıfının bir  $a$  elemanı için  $(k', d) \in a$ . O halde  $a$  kümesinin bir  $(j, e)$  elemanı için  $j' = k'$  ve  $\mathbf{F}(e) = d$ . Bu durumda  $j = k$  olmalıdır. Böylece  $(k, e) \in \bigcup \mathcal{C}$ , dolayısıyla  $e = c$  ve  $d = \mathbf{F}(c)$ , çünkü  $k \in a_0$  varsayılır. Öyleyse  $k' \in a_0$ . Tümevarımla  $a_0 = \omega$ .

Sonuç olarak  $\bigcup \mathcal{C}$ ,  $\omega$  kümesinden  $\mathbf{A}$  sınıfına giden bir  $\mathbf{G}$  göndermesidir.  $\mathcal{C}$  sınıfının tanımından  $\mathbf{G}$  göndermesinin istediğimiz özellikleri vardır.  $\square$

Şimdi, doğal sayılarda, (§), (¶), ve (||) satırlarındaki bütün tanımlar geçerlidir.

## 4 Ordinaler

### 4.1 Özyineleme

Doğal sayılarda, bir göndermenin özyineli tanımının iki tane parçası vardır, biri 0 için, biri ardılar için. Ordinalerde üçüncü bir parça gerekir, limitler için.

Tüm  $\alpha$  ordinaleri için

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \alpha + \beta' = (\alpha + \beta)' \quad (*)$$

olacak. Ama  $\beta$  limitse,  $\alpha + \beta$  nedir? Mesela  $\alpha + \omega$  nedir? Aslında 30 numaralı teoreme göre  $\omega$  kümesinden **ON** sınıfına giden, (\*) satırındaki özellikleri olan  $x \mapsto \alpha + x$  göndermesi vardır. Her  $n$  doğal sayısı için,

$$\alpha + n < \alpha + \omega$$

eşitsizliğini isteriz. Yani  $\alpha + \omega$ ,  $\{y: \exists x (x \in \omega \wedge y = \alpha + x)\}$  sınıfının üst sınırı olmalıdır (sınıfın üst sınırı varsa). Bu sınıf,  $\{\alpha + x: x \in \omega\}$  olarak yazılabilir.

Genelde  $F: A \rightarrow B$  ve  $C \subseteq A$  ise

$$\{y: \exists x (x \in C \wedge F(x) = y)\}$$

sınıfı,

$$\{F(x): x \in C\}, \quad F[C]$$

ifadelerinin biri olarak yazılabilir. Bu sınıf,  $C$  sınıfının  $F$  altında **görüntüsüdür**. Bu durumda,  $F$  göndermesi  $C$  sınıfında **tanımlanır**, çünkü  $C$ ,  $F$  göndermesinin tanım sınıfı tarafından kapsanır. Eğer  $F$ ,  $C$  sınıfında tanımlanmazsa,  $F[C]$  ifadesini yazmayacağız.



$\omega$  kümesinin  $\{\alpha + x : x \in \omega\}$  görüntüsünün üst sınırı varsa, en küçük üst sınırı, yani *supremumu*, vardır (çünkü **ON**, iyi sıralanır). Şimdi (\*) satırındaki özelliklere göre

$$\alpha \subseteq \alpha + 1 \subseteq \alpha + 2 \subseteq \dots$$

Eğer  $\bigcup\{\alpha + x : x \in \omega\}$  bir ordinalse,  $\{\alpha + x : x \in \omega\}$  kümesinin üst sınırıdır, aslında supremumdur.

**Teorem 31.** *Elemanları ordinal olan her sınıfın bileşimi, ya bir ordinal, ya da ordinallerin sınıfıdır.*

*Kanıt.*  $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{ON}$  olsun.  $b \in \bigcup \mathbf{A}$  ise,  $\mathbf{A}$  sınıfının bir  $\alpha$  elemanı için  $b \in \alpha$ , dolayısıyla  $b \subseteq \alpha$  ve onun için  $b \subseteq \bigcup \mathbf{A}$ . Öyleyse  $\bigcup \mathbf{A}$  geçişlidir. Ayrıca, **ON** sınıfı da geçişli olduğundan,  $\bigcup \mathbf{A} \subseteq \mathbf{ON}$ , dolayısıyla  $\bigcup \mathbf{A}$ ,  $\in$  tarafından iyi sıralanır. Öyleyse  $\bigcup \mathbf{A}$  ya bir ordinaldir, ya da küme olmayan bir sınıftır. İkinci durumda  $\bigcup \mathbf{A}$  bileşiminin **ON** olduğunu göstereceğiz. Eğer  $\bigcup \mathbf{A} \subset \mathbf{ON}$  ise  $\beta \in \mathbf{ON} \setminus \bigcup \mathbf{A}$  olsun. O zaman  $\bigcup \mathbf{A} \subseteq \beta$ , çünkü  $\bigcup \mathbf{A}$  geçişlidir (eğer  $\gamma \in \bigcup \mathbf{A}$  ise  $\gamma \subseteq \bigcup \mathbf{A}$ , dolayısıyla  $\beta \notin \gamma$  ve  $\gamma \leq \beta$ ). Bu durumda  $\bigcup \mathbf{A}$ , bir kümedir, dolayısıyla ordinaldir.  $\square$

Sonuç olarak, eğer  $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{ON}$  ve  $\bigcup \mathbf{A}$  bir kümeysse, o zaman bir ordinaldir; değilse, **ON** sınıfıdır. Şimdi  $\mathbf{A}$  bir kümeysse,  $\bigcup \mathbf{A}$  bileşiminin bir küme olduğunu isteriz:

**AKSİYOM 6** (Bileşim). *Her kümenin bileşimi, bir kümedir:*

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \Leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w)).$$

**Teorem 32.** *Ordinallerin oluşturduğu her kümenin bileşimi, kümenin supremumudur.*

*Kanıt.*  $a \subseteq \mathbf{ON}$  olsun. Son teorem ve Bileşim Aksiyomuna göre  $\bigcup a$ , bir  $\alpha$  ordinalidir. O zaman  $\alpha$ ,  $a$  kümesinin bir üst sınırıdır. Eğer  $\beta < \alpha$  ise, o zaman  $\beta \in \alpha$ , dolayısıyla  $a$  kümesinin bir  $\gamma$  elemanı için  $\beta \in \gamma$ , yani  $\beta < \gamma$ . Sonuç olarak  $\beta$ ,  $a$  kümesinin üst sınırı değildir. Öyleyse  $\alpha = \sup(a)$ .  $\square$

Şimdi  $\{\alpha + x : x \in \omega\}$  gibi görüntüler, küme olsun:

**AKSIYOM 7** (Yerleştirme). *Her göndermenin tanım sınıfının altkümünün gönderme altında görüntüsü, bir kümedir. Yani her ikili  $\varphi(x, y)$  formülü için*

$$\forall w \left( \forall x \forall y \forall z (\varphi(x, y) \wedge \varphi(x, z) \wedge x \in w \Rightarrow y = z) \right. \\ \left. \Rightarrow \exists z \forall y (y \in z \Leftrightarrow \exists x (x \in w \wedge \varphi(x, y))) \right).$$

Şimdi  $\beta$  ordinalinde  $x \mapsto \alpha + x$  göndermesi tanımlanırsa  $\{\alpha + x : x \in \beta\}$  görüntüsü, bir kümedir.  $\beta$  limitse

$$\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\} \quad (\dagger)$$

olsun. Bu koşul, (\*) satırındaki koşullarla, **ON** sınıfında  $x \mapsto \alpha + x$  işlemini tanımlayacaktır.

**Teorem 33** (Tümevarım).  $A \subseteq \mathbf{ON}$  olsun. Eğer

- 1)  $0 \in A$ ,
- 2) her  $\alpha$  için  $\alpha \in A \Rightarrow \alpha' \in A$ ,
- 3) her  $\alpha$  limiti için  $\alpha \subseteq A \Rightarrow \alpha \in A$

ise, o zaman  $A = \mathbf{ON}$ .

*Kanıt.* Hipotez altında  $\mathbf{ON} \setminus A$  farkının en küçük elemanı olamaz.  $\square$

Eğer  $F: A \rightarrow B$  ve  $C \subseteq A$  ise

$$F \cap (C \times B) = F \upharpoonright C$$

olsun. Bu  $F \upharpoonright C$  göndermesi,  $F$  göndermesinin  $C$  sınıfına **sınırlamasıdır** (restriction).

**Teorem 34** (Özyineleme).  $A$ , bir sınıf olsun, ve  $b \in A$ ,  $F: A \rightarrow A$ , ve  $G: \mathcal{P}(A) \rightarrow A$  olsun. O zaman **ON** sınıfından  $A$  sınıfına giden

$$H(0) = b, \\ H(\alpha') = F(H(\alpha)), \\ \alpha \text{ limit ise } H(\alpha) = G(\{H(\xi) : \xi < \alpha\})$$

özellikleri olan bir ve tek bir  $H$  göndermesi vardır.

*Kanıt.* Tümevarımla en çok bir  $\mathbf{H}$  göndermesi vardır. Çünkü  $\mathbf{H}_1$  göndermesinin ve  $\mathbf{H}$  göndermesinin özellikleri aynı olsun. O zaman

- 1)  $\mathbf{H}_1(0) = b = \mathbf{H}(0)$ ;
- 2)  $\mathbf{H}_1(\alpha) = \mathbf{H}(\alpha)$  ise

$$\mathbf{H}_1(\alpha') = \mathbf{F}(\mathbf{H}_1(\alpha)) = \mathbf{F}(\mathbf{H}(\alpha)) = \mathbf{H}(\alpha');$$

- 3)  $\alpha$  limit ise ve  $\mathbf{H}_1 \upharpoonright \alpha = \mathbf{H} \upharpoonright \alpha$  ise

$$\mathbf{H}_1(\alpha) = \mathbf{G}(\mathbf{H}_1[\alpha]) = \mathbf{G}(\mathbf{H}[\alpha]) = \mathbf{H}(\alpha).$$

30 numaralı teoremin kanıtındaki gibi bir  $\mathbf{C}$  sınıfı için  $\mathbf{H} = \bigcup \mathbf{C}$  olacaktır. Bu sınıfın tanımına göre her  $a$  elemanı için  $a \subseteq \mathbf{ON} \times \mathbf{A}$ , ve  $a$  kümesinin her  $(\alpha, d)$  elemanı için,

- ya  $(\alpha, d) = (0, b)$ ,
- ya da bir  $(\beta, c)$  elemanı için,  $\beta' = \alpha$  ve  $\mathbf{F}(c) = d$ ,
- ya da  $\alpha$  limit, ve  $a \cap (\alpha \times \mathbf{A})$  kesişimi, tanım kümesi  $\alpha$  olan bir  $f$  göndermesi, ve  $\mathbf{G}(f[\alpha]) = d$ .

Eğer  $\bigcup \mathbf{C}$  bileşimi, tanım sınıfı  $\mathbf{ON}$  olan bir gönderme değilse, bir *en küçük*  $\alpha$  için

$$\{x: x \in \mathbf{A} \wedge (\alpha, x) \in \bigcup \mathbf{C}\}$$

sınıfının ya hiç elemanı yoktur ya da en az iki elemanı vardır. O zaman  $\alpha \neq 0$ . Eğer  $\alpha = \beta'$  ise, o zaman bir  $c$  için  $(\beta, c) \in \bigcup \mathbf{C}$ , dolayısıyla  $(\alpha, \mathbf{F}(c)) \in \bigcup \mathbf{C}$ . Bu durumda eğer  $(\alpha, d) \in \bigcup \mathbf{C}$  ise bir  $e$  için  $d = \mathbf{F}(e)$  ve  $(\beta, e) \in \bigcup \mathbf{C}$ , dolayısıyla  $c = e$  ve  $d = \mathbf{F}(c)$  (çünkü  $\alpha$  en küçüktür). Öyleyse  $\alpha$  ardıl olamaz. Benzer şekilde  $\alpha$  limit olamaz. Sonuç olarak  $\bigcup \mathbf{C}$  bileşimi, tanım sınıfı  $\mathbf{ON}$  olan bir gönderme olmalıdır. Bu göndermenin, tanımından dolayı istediğimiz özellikleri vardır.  $\square$

## 4.2 Toplama

Son teoreme göre her  $\alpha$  için (\*) ve (†) satırlarındaki koşullar **ON** sınıfında  $x \mapsto \alpha + x$  işlemini tanımlar. Yani

$$\begin{aligned}\alpha + 0 &= \alpha, \\ \alpha + \beta' &= (\alpha + \beta)', \\ \beta \text{ limit} &\Rightarrow \alpha + \beta = \sup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\}.\end{aligned}$$

Özel olarak

$$\alpha + 1 = \alpha'.$$

O zaman

$$1 + \omega = \sup\{1 + x : x \in \omega\} = \omega < \omega + 1,$$

ve genelde  $0 < n < \omega$  ise

$$n + \omega = \omega < \omega + n.$$

Böylece **ON** sınıfında toplama değişmeli değildir.

**Teorem 35.**  $\beta < \gamma$  ise  $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ .

*Kanıt.*  $\gamma$  üzerinden tümevarım kullanacağız.

1.  $\gamma = 0$  ise, iddia doğrudur, çünkü hiçbir zaman  $\beta < 0$  değildir.
2.  $\gamma = \delta$  durumunda iddianın doğru olduğu varsayalım. Eğer  $\beta < \delta'$  ise, o zaman  $\beta \leq \delta$ , dolayısıyla

$$\alpha + \beta \leq \alpha + \delta < (\alpha + \delta)' = \alpha + \delta'.$$

3.  $\delta$  limit,  $\gamma < \delta$  durumunda iddia doğru, ve  $\beta < \delta$  ise, o zaman  $\beta < \beta' < \delta$ , dolayısıyla

$$\alpha + \beta < \alpha + \beta' \leq \sup_{\xi < \delta} (\alpha + \xi) = \alpha + \delta. \quad \square$$

**Teorem 36.**  $\beta \leq \gamma$  ise  $\beta + \alpha \leq \gamma + \alpha$ .

*Kanıt.* Şimdi  $\alpha$  üzerinden tümevarım kullanacağız.  $\beta \leq \gamma$  olsun.

$$1. \beta + 0 = \beta \leq \gamma = \gamma + 0.$$

$$2. \beta + \alpha = \gamma + \alpha \text{ ise tabii ki}$$

$$\beta + \alpha' = (\beta + \alpha)' = (\gamma + \alpha)' = \gamma + \alpha'.$$

$\beta + \alpha < \gamma + \alpha$  ise, 28 numaralı teoreme göre

$$\beta + \alpha' = (\beta + \alpha)' \leq \gamma + \alpha < (\gamma + \alpha)' = \gamma + \alpha'.$$

3.  $\delta$  limit olsun, ve  $\alpha < \delta$  ise,  $\beta + \alpha \leq \gamma + \alpha$  olsun. O zaman

$$\beta + \delta = \sup_{\xi < \gamma} (\beta + \xi) \leq \sup_{\xi < \gamma} (\gamma + \xi) = \gamma + \delta. \quad \square$$

Gördüğümüz gibi aynı zamanda  $\beta < \gamma$  ama  $\beta + \alpha = \gamma + \alpha$  olabilir, mesela  $0 < k < \ell < \omega$  ise  $k + \omega = \ell + \omega$ .

**Teorem 37.** Her  $\alpha$  için  $0 + \alpha = \alpha$ .

*Alıştırma 18.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 38.**  $\alpha \leq \beta$  ise

$$\alpha + \xi = \beta$$

denkleminin bir ve tek bir çözümü vardır. Yani  $\alpha + x = \beta$  denkleminin bir ve tek bir ordinal çözümü vardır.

*Kanıt.* 35 numaralı teoreme göre denklemin en çok bir çözümü vardır. 36 ve 37 numaralı teoremlere göre

$$\alpha + \beta \geq 0 + \beta = \beta,$$

dolayısıyla  $\{\xi : \beta \leq \alpha + \xi\}$  boş değildir (çünkü  $\beta$  elemanını içerir). En küçük elemanı,  $\delta$  olsun. Üç durum vardır.

1.  $\delta = 0$  ise

$$\beta \leq \alpha + \delta = \alpha,$$

dolayısıyla  $\beta = \alpha = \alpha + \delta$  (çünkü  $\alpha \leq \beta$  da sağlanır).

2.  $\delta = \gamma'$  ise  $\alpha + \gamma < \beta$ , dolayısıyla

$$\alpha + \delta = (\alpha + \gamma)' \leq \beta, \quad \alpha + \delta = \beta$$

(çünkü  $\alpha + \delta \geq \beta$  da sağlanır).

3.  $\delta$  limit olsun. Eğer  $\gamma < \delta$  ise  $\alpha + \gamma < \beta$  olmalıdır. O zaman

$$\alpha + \delta = \sup_{\xi < \delta} (\alpha + \xi) \leq \beta, \quad \alpha + \delta = \beta. \quad \square$$

$\alpha \leq \beta$  durumunda  $\alpha + \xi = \beta$  denkleminin çözümü için

$$\beta - \alpha$$

ifadesi yazılabilir. Örneğin  $\alpha' - 1 = \alpha$ .

**Teorem 39.**  $\beta$  limitse  $\alpha + \beta$  toplamı da limitlidir.

*Alıştırma 19.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 40.** Tüm  $\alpha$ ,  $\beta$ , ve  $\gamma$  için

$$\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma.$$

*Kanıt.*  $\gamma$  üzerinden tümevarım kullanacağız.

1.  $\alpha + (\beta + 0) = \alpha + \beta = (\alpha + \beta) + 0.$

2.  $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$  ise

$$\begin{aligned} \alpha + (\beta + \gamma') &= \alpha + (\beta + \gamma)' = (\alpha + (\beta + \gamma))' \\ &= ((\alpha + \beta) + \gamma)' = (\alpha + \beta) + \gamma'. \end{aligned}$$

3.  $\delta$  limit olsun, ve  $\gamma < \delta$  ise  $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$  olsun. Ama  $\gamma < \delta$  ise

$$\beta + \gamma < \beta + \delta, \quad \alpha + (\beta + \gamma) < \alpha + (\beta + \delta).$$

Öyleyse

$$(\alpha + \beta) + \delta = \sup_{\xi < \delta} ((\alpha + \beta) + \xi) = \sup_{\xi < \delta} (\alpha + (\beta + \xi)) \leq \alpha + (\beta + \delta).$$

Ayrıca, 39 numaralı teoreme göre  $\beta + \delta$  limit olduğundan

$$\alpha + (\beta + \delta) = \sup_{\xi < \beta + \delta} (\alpha + \xi).$$

Dahası  $\theta < \beta + \delta$  ise, bir  $\gamma$  için  $\gamma < \delta$  ve  $\theta < \beta + \gamma$  (çünkü  $\beta + \delta = \sup\{\beta + \xi : \xi < \delta\}$ ). O halde

$$\sup_{\xi < \beta + \delta} (\alpha + \xi) \leq \sup_{\xi < \delta} (\alpha + (\beta + \xi)) = (\alpha + \beta) + \delta.$$

Sonuç olarak  $\alpha + (\beta + \delta) = (\alpha + \beta) + \delta$ .  $\square$

Aslında son teoremin kanıtı, genel bir yöntemin örneğidir. **ON** sınıfında  $x \mapsto \alpha + x$  işlemi,

- 1)  $\beta < \gamma \Rightarrow \mathbf{F}(\beta) < \mathbf{F}(\gamma)$ ,
- 2)  $\gamma$  limitse  $\mathbf{F}(\gamma) = \sup\{\mathbf{F}(\xi) : \xi < \gamma\}$

koşullarını sağlayan bir  $\mathbf{F}$  işlemidir. Bu tip herhangi bir işleme **normal** (*normal*) denir. İlk koşula göre  $\mathbf{F}$ , **kesin artan** (*strictly increasing*) bir göndermedir. O zaman ikinci koşula göre  $\mathbf{F}$ , **süreklidir** (*continuous*).

**Teorem 41.** *Eğer  $0 < a < \mathbf{ON}$  ve  $\sup(a) \notin a$ , o zaman  $\sup(a)$ , bir limittir.*

*Alıştırma 20.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 42.**  *$\mathbf{F}$ , **ON** sınıfında normal bir işlem olsun. Tüm boş olmayan ordinallerin oluşturduğu  $a$  kümeleri için*

$$\mathbf{F}(\sup(a)) = \sup(\mathbf{F}[a]),$$

*yani*

$$\mathbf{F}(\sup_{x \in a} x) = \sup_{x \in a} \mathbf{F}(x).$$

*Kanıt.*  $\sup(a) = \beta$  olsun. Eğer  $\beta \in a$  ise,  $\mathbf{F}$  işlemi artan olduğundan

$$\mathbf{F}(\beta) = \sup_{x \in a} \mathbf{F}(x).$$

Şimdi  $\beta \notin a$  olsun. Son teoreme göre  $\beta$  bir limit olmalıdır. Ayrıca  $a \subseteq \beta$ , dolayısıyla

$$\sup(\mathbf{F}[a]) \leq \sup(\mathbf{F}[\beta]) = \mathbf{F}(\beta)$$

(çünkü  $\mathbf{F}$  süreklidir). Dahası  $\alpha < \beta$  ise,  $a$  kümesinin bir  $\gamma$  elemanı için  $\alpha < \gamma$ , dolayısıyla

$$\mathbf{F}(\beta) = \sup(\mathbf{F}[\beta]) \leq \sup(\mathbf{F}[a])$$

(yine  $\mathbf{F}$  sürekli olduğu için). □

Bu teoremde  $a = 0$  ise  $\sup(\mathbf{F}[a]) = \sup(0) = 0$ , ama  $\mathbf{F}$  normal olunca,  $\mathbf{F}(0) > 0$  olabilir.

Bir  $\delta$  limiti için, eğer

$$\gamma < \delta \Rightarrow \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$$

ise, o zaman teoreme göre

$$\begin{aligned} \alpha + (\beta + \delta) &= \alpha + \sup_{\xi < \delta} (\beta + \xi) \\ &= \sup_{\xi < \delta} (\alpha + (\beta + \xi)) = \sup_{\xi < \delta} ((\alpha + \beta) + \xi) = (\alpha + \beta) + \delta, \end{aligned}$$

çünkü  $x \mapsto \alpha + x$ , normaldir.

### 4.3 Çarpma

Her  $\alpha$  için **ON** sınıfında  $x \mapsto \alpha \cdot x$  işlemi, tanımına göre,

$$\begin{aligned} \alpha \cdot 0 &= 0, \\ \alpha \cdot \beta' &= \alpha \cdot \beta + \alpha, \\ \gamma \text{ limit} &\Rightarrow \alpha \cdot \gamma = \sup\{\alpha \cdot \xi : \xi < \gamma\} \end{aligned}$$

koşulları sağlar. Özel olarak

$$\alpha \cdot 1 = \alpha.$$



Örneğin

$$\omega \cdot 2 = \omega \cdot 1 + \omega = \omega + \omega = \sup_{x \in \omega} (\omega + x),$$

$$2 \cdot \omega = \sup_{x \in \omega} (2 \cdot x) = \omega,$$

dolayısıyla

$$2 \cdot \omega < \omega \cdot 2.$$

**Teorem 43.**  $0 \cdot \alpha = 0$  ve  $1 \cdot \alpha = \alpha$ .

*Alıştırma 21.* Teoremi kanıtlayın.

$\alpha \geq 1$  ise,  $\xi \mapsto \alpha \cdot \xi$  işleminin normal olduğunu kanıtlayacağız. Bu işlem kesin artan ise, tanımdan dolayı süreklidir, dolayısıyla normaldir. O zaman 35 numaralı teorem gibi bir teorem yeterli olacaktır, çünkü 35 numaralı teorem, genel bir yöntem gösterir:

**Teorem 44.** Eğer  $F: \mathbf{ON} \rightarrow \mathbf{ON}$ , ve tüm  $\alpha$  için

$$F(\alpha) < F(\alpha'),$$

ve limit olan tüm  $\beta$  için

$$F(\beta) = \sup_{\xi < \beta} F(\xi)$$

ise, o zaman  $F$  normaldir.

*Alıştırma 22.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 45.**  $\alpha \geq 1$  ise  $\xi \mapsto \alpha \cdot \xi$  işlemi, normaldir.

*Alıştırma 23.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 46.**  $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$ .

*Kanıt.*  $\gamma = 0$  durumunda kanıt kolaydır.  $\gamma = \delta$  durumunda iddia doğrudur.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta + \delta') &= \alpha \cdot (\beta + \delta)' \\ &= \alpha \cdot (\beta + \delta) + \alpha \\ &= (\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \delta) + \alpha \\ &= \alpha \cdot \beta + (\alpha \cdot \delta + \alpha) \\ &= \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \delta'; \end{aligned}$$

böylece  $\gamma = \delta'$  durumunda iddia doğrudur. Son olarak  $\delta$  limit, ve  $\gamma < \delta$  durumunda iddia doğru olsun.  $\gamma = \delta$  durumunu kanıtlayacağız.  $\alpha = 0$  ise iddia kolaydır.  $\alpha \geq 1$  olsun. O zaman  $\xi \mapsto \alpha \cdot \xi$  ve  $\xi \mapsto \alpha \cdot \beta + \xi$  işlemleri normal olduğundan

$$\begin{aligned}
 \alpha \cdot (\beta + \delta) &= \alpha \cdot \sup_{\xi < \delta} (\beta + \xi) \\
 &= \sup_{\xi < \delta} (\alpha \cdot (\beta + \xi)) \\
 &= \sup_{\xi < \delta} (\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \xi) \\
 &= \alpha \cdot \beta + \sup_{\xi < \delta} (\alpha \cdot \xi) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \delta. \quad \square
 \end{aligned}$$

Gördüğümüz gibi  $2 \cdot \omega < \omega + \omega$ , dolayısıyla

$$(1 + 1) \cdot \omega < 1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega.$$

**Teorem 47.**  $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ .

*Alıştırma 24.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 48.**  $\beta \leq \gamma$  ise  $\beta \cdot \alpha \leq \gamma \cdot \alpha$ .

*Alıştırma 25.* Teoremi kanıtlayın.

Şimdi  $\xi$  gibi  $\eta$ , ordinal değişken olsun.

**Teorem 49.**  $1 \leq \alpha$  ise

$$\alpha \cdot \xi + \eta = \beta \wedge \eta < \alpha$$

*sisteminin bir ve tek bir çözümü vardır.*

*Kanıt.*  $\alpha \cdot \beta \geq 1 \cdot \beta = \beta$  ve  $\xi \mapsto \alpha \cdot \xi$  artan olduğundan

$$\{\xi: \alpha \cdot \xi \leq \beta\} \subseteq \beta',$$

dolayısıyla  $\bigcup\{\xi: \alpha \cdot \xi \leq \beta\}$ , bir  $\gamma$  ordinalidir. Böylece

$$\gamma = \sup\{\xi: \alpha \cdot \xi \leq \beta\}.$$

Eğer  $\gamma \in \{\xi: \alpha \cdot \xi \leq \beta\}$  ise  $\alpha \cdot \gamma \leq \beta$ . Değilse  $\gamma$  limit olmalıdır, dolayısıyla

$$\alpha \cdot \gamma = \sup_{\xi < \gamma} (\alpha \cdot \xi) \leq \beta.$$

Şimdi  $\alpha \cdot \gamma + \eta = \beta$  denkleminin  $\delta$  çözümü vardır. Eğer  $\delta \geq \alpha$  ise  $\alpha + \xi = \delta$  denkleminin bir  $\theta$  çözümü vardır, dolayısıyla

$$\begin{aligned} \beta &= \alpha \cdot \gamma + \delta = \alpha \cdot \gamma + \alpha + \theta = \alpha \cdot \gamma' + \theta, \\ \gamma' &\in \{\xi: \alpha \cdot \xi \leq \beta\}, \\ \gamma' &\leq \gamma, \end{aligned}$$

ki bu imkânsızdır. Öyleyse  $\delta < \alpha$ , ve  $(\gamma, \delta)$ , istediğimiz çözümdür. Benzer şekilde başka çözüm yoktur, çünkü

$$\alpha \cdot \gamma + \delta = \alpha \cdot \gamma_1 + \delta_1, \quad \gamma < \gamma_1$$

ise  $\gamma' \leq \gamma_1$ , dolayısıyla bir  $\theta$  için

$$\begin{aligned} \gamma' + \theta &= \gamma_1, \\ \alpha \cdot \gamma + \delta &= \alpha \cdot \gamma_1 + \delta_1 = \alpha \cdot \gamma + \alpha + \alpha \cdot \theta + \delta_1, \\ \delta &= \alpha + \alpha \cdot \theta + \delta_1 \geq \alpha. \end{aligned} \quad \square$$

## 4.4 Kuvvet alma

Her  $\alpha$  için,  $\alpha > 0$  ise, **ON** sınıfında  $x \mapsto \alpha^x$  işlemi, tanımına göre,

$$\begin{aligned} \alpha^0 &= 1, \\ \alpha^{\beta'} &= \alpha^\beta \cdot \alpha, \\ \gamma \text{ limit} &\Rightarrow \alpha^\gamma = \sup\{\alpha^\xi: \xi < \gamma\} \end{aligned}$$

koşullarını sağlar. Özel olarak

$$\alpha^1 = \alpha.$$

Ayrıca, tanıma göre,

$$0^0 = 1, \quad \beta > 0 \Rightarrow 0^\beta = 0.$$

Öyleyse  $\gamma$  limit ise  $0^\gamma$  kuvveti,  $\sup\{0^\xi : \xi < \gamma\}$  değildir, ama

$$0^\gamma = \sup\{0^\xi : 0 < \xi < \gamma\}.$$

**Teorem 50.**  $1^\alpha = 1$ .

*Alıştırma 26.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 51.**  $\alpha \leq \beta$  ise  $\alpha^\gamma \leq \beta^\gamma$ .

*Alıştırma 27.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 52.**  $\alpha \geq 2$  ise  $\xi \mapsto \alpha^\xi$  işlemi, normaldir.

*Alıştırma 28.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 53.**  $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$ .

*Alıştırma 29.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 54.**  $\alpha^{\beta \cdot \gamma} = (\alpha^\beta)^\gamma$ .

*Alıştırma 30.* Teoremi kanıtlayın.

İlkokuldan bildiğimiz gibi, eğer  $2 \leq t < \omega$  ve  $1 \leq a < \omega$  ise, o zaman bir  $n$  doğal sayısı için,  $n + 1$  tane  $a_0, a_1, \dots, a_n$  doğal sayısı için

$$\{a_0, a_1, \dots, a_n\} \subseteq t, \quad a_0 \neq 0,$$

ve

$$a = t^n \cdot a_0 + t^{n-1} \cdot a_1 + \dots + t^0 \cdot a_n.$$

O zaman  $a$  sayısı,

$$a_0 a_1 \dots a_n \quad \text{veya} \quad (a_0 a_1 \dots a_n)_t$$

olarak yazılabilir; bu ifade,  $a$  sayısının  $t$  tabanında yazılımıdır [15, 17. böl.] (*base- $t$  numeral*). 0 olan  $a_i$  rakamları (*digits*) çıkartılırsa,  $\omega$  kümesinin bir  $m$  elemanı için,  $\omega$  kümesinin

$$b_0 > b_1 > \dots > b_m, \quad \{c_0, c_1, \dots, c_m\} \subseteq \{1, \dots, t-1\},$$

ve

$$a = t^{b_0} \cdot c_0 + t^{b_1} \cdot c_1 + \dots + t^{b_m} \cdot c_m$$

koşullarını sağlayan  $b_i$  ve  $c_i$  elemanları vardır. Böylece  $a$  sayısı,

$$\{(b_0, c_0), (b_1, c_1), \dots, (b_m, c_m)\}$$

göndermesini belirtir. Göstereceğimiz gibi her 0 olmayan ordinal, böyle bir gönderme belirtir.

**Teorem 55.** *Eğer  $F$ ,  $\mathbf{ON}$  sınıfında kesin artan bir işlemse, tüm  $\alpha$  için*

$$\alpha \leq F(\alpha).$$

*Kanıt.*  $\alpha > F(\alpha)$  ise,  $F$  kesin artan olduğundan  $F(\alpha) > F(F(\alpha))$ , dolayısıyla  $\{\xi: \xi > F(\xi)\}$  sınıfının en küçük elemanı yoktur.  $\mathbf{ON}$  iyi sıralanmış olduğundan  $\{\xi: \xi > F(\xi)\}$  sınıfı boş olmalıdır.  $\square$

Örneğin  $\alpha > 1$  ise  $\alpha^\beta \geq \beta$ , dolayısıyla sonraki teorem kanıtlanabilir. Şimdi  $\xi$  ve  $\eta$  gibi  $\zeta$ , ordinal değişken olsun.

**Teorem 56.**  $\alpha \geq 2$  ise her 0 olmayan  $\beta$  için

$$\alpha^\xi \cdot \eta + \zeta = \beta \wedge \eta < \alpha \wedge \zeta < \alpha^\xi$$

*sisteminin bir ve tek bir  $(\gamma, \delta, \theta)$  çözümü vardır, ve ayrıca  $\gamma \leq \beta$ .*

*Alıştırma 31.* Teoremi kanıtlayın.

Sonuç olarak  $\alpha > 1$  ise, her 0 olmayan  $\beta$  için

$$\gamma_0 > \gamma_1 > \dots,$$

ve

$$0 < \delta_0 < \alpha, \quad 0 < \delta_1 < \alpha, \quad \dots,$$

ve

$$\beta = \alpha^{\gamma_0} \cdot \delta_0 + \alpha^{\gamma_1} \cdot \delta_1 + \dots$$

koşullarını sağlayan  $\gamma_i$  ve  $\delta_i$  ordinaleri vardır. Ayrıca,  $\mathbf{ON}$  iyi sıralanmış olduğundan, kesin azalan  $(\gamma_0, \gamma_1, \dots)$  dizisi sona ermelidir. Yani bir  $n$  doğal sayısı için

$$\beta = \alpha^{\gamma_0} \cdot \delta_0 + \alpha^{\gamma_1} \cdot \delta_1 + \dots + \alpha^{\gamma_n} \cdot \delta_n.$$

Buradaki  $\{(\gamma_0, \delta_0), (\gamma_1, \delta_1), \dots, (\gamma_n, \delta_n)\}$  kümesine, sonraki teoremdede

$$\beta_\alpha$$

adı verilecek.\* Genel olarak bu kümeyi tanımlamak için (yani  $\xi \mapsto \xi_\alpha$  göndermesini tanımlamak için), özyinelemeyi 34 numaralı teoremden farklı bir şekilde kullanacağız.

**Teorem 57.** *Tanım sınıfı bir küme olan her gönderme bir kümedir.*

*Alıştırma 32.* Teoremi kanıtlayın.

Herhangi  $\mathbf{A}$  sınıfı ve  $b$  kümesi için

$${}^b\mathbf{A},$$

$b$  kümesinden  $\mathbf{A}$  sınıfına giden göndermelerin sınıfı olsun.

*Alıştırma 33.*  $\mathcal{P}(a) \approx {}^a2$  eşlenikliğini kanıtlayın.

**Teorem 58** (Özyineleme).  *$\mathbf{A}$  bir sınıf olsun, ve*

$$\mathbf{F}: \{x: \exists \eta x \in {}^\eta\mathbf{A}\} \rightarrow \mathbf{A}$$

*olsun.† O zaman  $\mathbf{ON}$  sınıfından  $\mathbf{A}$  sınıfına giden ve her  $\alpha$  ordinali için*

$$\mathbf{G}(\alpha) = \mathbf{F}(\mathbf{G} \upharpoonright \alpha)$$

*koşulunu sağlayan bir ve tek bir  $\mathbf{G}$  göndermesi vardır.*

*Kanıt.* Tanım kümesi bir ordinal olan, ve bu ordinalin tüm  $\alpha$  elemanları için

$$g(\alpha) = \mathbf{F}(g \upharpoonright \alpha)$$

koşulunu sağlayan  $g$  göndermelerinin oluşturduğu sınıf,  $\mathbf{B}$  olsun. Eğer  $\mathbf{B}$  sınıfının bir  $g$  elemanının tanım kümesi  $\alpha$ , bir  $h$  elemanının tanım kümesi  $\beta$ , ve  $\alpha \leq \beta$  ise, o zaman

$$g \subseteq h$$

(neden?). Sonuç olarak istediğimiz gönderme,  $\bigcup \mathbf{B}$  (neden?). □

\*Bu  $\beta_\alpha$  ifadesi, benimdir; başka kitaplarda görmedim.

† $\{x: \exists \eta x \in {}^\eta\mathbf{A}\}$  sınıfı,  $\bigcup_\eta {}^\eta\mathbf{A}$  olarak yazılabilir; ama  ${}^\beta\mathbf{A}$  sınıfları küme olmayabilir.

**Teorem 59.**  $\alpha \geq 2$  ise bir ve tek bir  $\xi \mapsto \xi_\alpha$  göndermesi vardır öyle ki

$$\beta = \alpha^\gamma \cdot \delta + \theta, \quad \delta < \alpha, \quad \theta < \alpha^\gamma \quad (\ddagger)$$

ise, o zaman

$$\beta_\alpha = \{(\gamma, \delta)\} \cup \theta_\alpha.$$

*Kanıt.* 56 numaralı teoreme göre,  $(\ddagger)$  koşullarını sağlayan bir ve tek bir  $(\gamma, \delta, \theta)$  üçlüsü vardır. Ayrıca  $\theta < \beta$ . O zaman öyle bir  $\mathbf{F}$  göndermesi vardır ki her  $\beta$  için, eğer  $g$ , tanım kümesi  $\beta$  olan (ve değer kümesi herhangi bir küme olan) bir gönderme, ve  $(\gamma, \delta, \theta)$  üçlüsü,  $(\ddagger)$  satırındaki gibiyse, o zaman

$$\mathbf{F}(g) = \{(\gamma, \delta)\} \cup g(\beta).$$

Öyleyse istediğimiz  $\beta \mapsto \beta_\alpha$  göndermesi, son teoreme göre

$$\mathbf{G}(\beta) = \mathbf{F}(\mathbf{G} \upharpoonright \beta)$$

koşulunu sağlayan  $\mathbf{G}$  göndermesidir. □

## 4.5 Cantor normal biçimi

Eğer  $\beta_\omega = \{(\alpha_0, k_0), \dots, (\alpha_n, k_n)\}$  ise, o zaman

$$\beta = \omega^{\alpha_0} \cdot k_0 + \omega^{\alpha_1} \cdot k_1 + \dots + \omega^{\alpha_n} \cdot k_n.$$

7 numaralı sayfada dediğimiz gibi bu toplam,  $\beta$  ordinalinin **Cantor normal biçimidir** (*Cantor normal form*). Buradaki  $\alpha_0$  üssü,  $\beta$  ordinalinin **derecesidir** (*degree*). Bu derece

$$\text{der}(\beta)$$

olarak yazılsın.

**Teorem 60.**  $\alpha > 0$  ise

$$1 + \omega^\alpha = \omega^\alpha.$$

*Alıştırma 34.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 61.**  $\text{der}(\alpha) < \text{der}(\beta)$  ise

$$\alpha + \beta = \beta.$$

*Kanıt.*  $\alpha < \beta$  ise  $\omega^\alpha + \omega^\beta = \omega^\beta$  eşitliğini kanıtlayacağız. Bu durumda bir  $\gamma$  için,  $\beta = \alpha + \gamma$  ve  $\gamma > 0$ , dolayısıyla

$$\omega^\alpha + \omega^\beta = \omega^\alpha + \omega^{\alpha+\gamma} = \omega^\alpha \cdot (1 + \omega^\gamma) = \omega^\alpha \cdot \omega^\gamma = \omega^{\alpha+\gamma} = \omega^\beta. \quad \square$$

Örneğin

$$\begin{aligned} (\omega^{\omega^2} + \omega^{\omega \cdot 4+7} \cdot 5 + \omega^{\omega \cdot 2} \cdot 7 + 2) + (\omega^{\omega \cdot 4+7} \cdot 8 + \omega \cdot 3 + 16) \\ = \omega^{\omega^2} + \omega^{\omega \cdot 4+7} \cdot 13 + \omega \cdot 3 + 16. \end{aligned}$$

**Teorem 62.**  $\alpha > \text{der}(\beta)$  ve  $1 \leq k < \omega$  ve  $1 \leq n < \omega$  ise

$$(\omega^\alpha \cdot k + \beta) \cdot n = \omega^\alpha \cdot k \cdot n + \beta.$$

*Kanıt.*  $n = 1$  durumunda iddia doğrudur.  $n = m$  durumunda doğruysa

$$\begin{aligned} (\omega^\alpha \cdot k + \beta) \cdot (m+1) &= (\omega^\alpha \cdot k + \beta) \cdot m + \omega^\alpha \cdot k + \beta \\ &= \omega^\alpha \cdot k \cdot m + \beta + \omega^\alpha \cdot k + \beta \\ &= \omega^\alpha \cdot k \cdot m + \omega^\alpha \cdot k + \beta \\ &= \omega^\alpha \cdot k \cdot (m+1) + \beta, \end{aligned}$$

dolayısıyla  $n = m + 1$  durumunda da doğrudur. Tümevarımdan  $1 \leq n < \omega$  ise iddia doğrudur.  $\square$

Örneğin

$$(\omega^\omega \cdot 2 + \omega + 5) \cdot 7 = \omega^\omega \cdot 14 + \omega + 5.$$

**Teorem 63.**  $1 \leq \alpha$  ve  $0 < \beta$  ise

$$\alpha \cdot \omega^\beta = \omega^{\text{der}(\alpha)+\beta}.$$



*Kanıt.* Önce  $\beta = 1$  durumunda iddiayı kanıtlayacağız.  $1 \leq \alpha < \omega$  ise  $\text{der}(\alpha) = 0$ , dolayısıyla

$$\alpha \cdot \omega^1 = \alpha \cdot \omega = \sup_{x \in \omega} \alpha \cdot x = \omega = \omega^{\text{der}(\alpha)+1}.$$

Şimdi  $\omega \leq \alpha$  olsun. O zaman

$$\alpha = \omega^\gamma \cdot k + \delta, \quad \alpha > \text{der}(\gamma), \quad 1 \leq k < \omega$$

koşullarını sağlayan  $\gamma$ ,  $k$ , ve  $\delta$  vardır. O halde  $1 \leq n < \omega$  ise

$$\begin{aligned} \omega^\gamma \cdot k &\leq \alpha \leq \alpha \cdot n = \omega^\gamma \cdot k \cdot n + \delta < \omega^\gamma \cdot (k \cdot n + 1) < \omega^{\gamma+1}, \\ \omega^{\gamma+1} &= \sup_{1 \leq \xi < \omega} (\omega^\gamma \cdot \xi) \leq \sup_{1 \leq \xi < \omega} (\alpha \cdot \xi) \leq \omega^{\gamma+1}, \\ \alpha \cdot \omega &= \omega^{\gamma+1} = \omega^{\text{der}(\alpha)+1}. \end{aligned}$$

Genelde  $\alpha \geq 1$  ve  $\beta \geq 1$  ise, bir  $\theta$  için  $\beta = 1 + \theta$ , dolayısıyla

$$\alpha \cdot \omega^\beta = \alpha \cdot \omega \cdot \omega^\theta = \omega^{\text{der}(\alpha)+1+\theta} = \omega^{\text{der}(\alpha)+\beta}. \quad \square$$

Örneğin

$$\begin{aligned} 5 \cdot (\omega^2 \cdot 3 + \omega \cdot 16 + 7) &= \omega^2 \cdot 3 + \omega \cdot 16 + 35, \\ (\omega^\omega \cdot 2 + \omega + 5) \cdot (\omega^2 \cdot 3 + \omega \cdot 16) &= \omega^{\omega+2} \cdot 3 + \omega^{\omega+1} \cdot 16, \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} (\omega^\omega \cdot 2 + \omega + 5) \cdot (\omega^2 \cdot 3 + \omega \cdot 16 + 7) \\ = \omega^{\omega+2} \cdot 3 + \omega^{\omega+1} \cdot 16 + \omega^\omega \cdot 14 + \omega + 5. \end{aligned}$$

**Teorem 64.**  $1 \leq k < \omega$  ve  $n < \omega \leq \alpha$  ise

$$k^{\omega^{n+1}} = \omega^{\omega^n}, \quad k^{\omega^\alpha} = \omega^{\omega^\alpha}.$$

*Alıştırma 35.* Teoremi kanıtlayın. *İpucu:*  $n + 1 = 1 + n$  ve  $\alpha = 1 + \alpha$ .

Örneğin

$$2^{\omega^\omega \cdot 3 + \omega^5 \cdot 4 + \omega \cdot 7 + 5} = \omega^{\omega^\omega \cdot 3 + \omega^4 \cdot 4 + 7} \cdot 32.$$

**Teorem 65.**  $\omega \leq \alpha$  ve  $\beta$  limit ve  $n < \omega$  ise

$$\alpha^{\beta+n} = \omega^{\text{der}(\alpha) \cdot \beta} \cdot \alpha^n.$$

*Alıştırma 36.* Teoremi kanıtlayın. *İpucu:* Önce  $\alpha^\omega = \omega^{\text{der}(\alpha) \cdot \omega}$  denkleğini kanıtlayın.

Örneğin

$$\begin{aligned} & (\omega^{\omega+1} + \omega^2 + 1)^{\omega^2 + \omega \cdot 3 + 2} \\ &= \omega^{(\omega+1) \cdot (\omega^2 + \omega \cdot 3)} \cdot (\omega^{\omega+1} + \omega^2 + 1)^2 \\ &= \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3} \cdot (\omega^{\omega+1} + \omega^2 + 1)^2 \\ &= \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3} \cdot (\omega^{\omega+1+\omega+1} + \omega^{\omega+1+2} + \omega^{\omega+1} + \omega^2 + 1) \\ &= \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3} \cdot (\omega^{\omega \cdot 2 + 1} + \omega^{\omega+3} + \omega^{\omega+1} + \omega^2 + 1) \\ &= \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3 + \omega \cdot 2 + 1} + \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3 + \omega + 3} \\ &\quad + \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3 + \omega + 1} + \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3 + 2} + \omega^{\omega^3 + \omega^2 \cdot 3}. \end{aligned}$$

## 5 Kardinaller

### 5.1 Eşleniklik

Eğer  $R$  ve  $S$ , iki bağıntıysa, o zaman tanıma göre

$$R/S = \{(x, z) : \exists y (x R y \wedge y S z)\}.$$

Bu yeni bağıntı,  $R$  ile  $S$  bağıntılarının **bileşkesidir** (*composite*).  $S/R$  bileşkesi,  $R/S$  bileşkesinden farklı olabilir.

**Teorem 66.** *Eğer  $F: A \rightarrow B$  ve  $G: B \rightarrow C$  ise, o zaman*

$$F/G: A \rightarrow C, \quad \forall x (x \in A \Rightarrow (F/G)(x) = G(F(x))).$$

*Alıştırma 37.* Teoremi kanıtlayın.

Teoremdeki durumda  $F/G$  göndermesi,

$$G \circ F$$

olarak yazılır.

Şimdi  $F: A \rightarrow B$  olsun. Eğer  $F$  bağıntısının  $\check{F}$  ters bağıntısı,  $B$  sınıfından  $A$  sınıfına giden bir göndermeyse, o zaman bu gönderme,  $F$  göndermesinin **ters göndermesi** veya **tersidir** (*inverse*), ve

$$F^{-1}$$

olarak yazılır. Bu durumda  $F$  göndermesi,  $A$  sınıfından  $B$  sınıfına giden bir **eşlemedir** (*bijection*), ve  $A$  ile  $B$  sınıflarının kendileri, birbirleriyle **eşleniktir** (*equipollent*).

**Teorem 67.** *Bir sınıf, bir kümeyle eşlenikse, sınıf da bir kümedir.*

*Alıştırma 38.* Teoremi kanıtlayın.

67 ve 57 numaralı teoremler sayesinde *kümelerin* eşlenikliği, ikili bir bağıntıdır. Bu bağıntının işareti

$\approx$

olsun. O zaman  $=$  gibi  $\approx$ , yeni bir yüklemidir. Ayrıca

$$a \approx b \text{ denktir } \exists w \left( \forall x \exists y \left( (x \in a \Rightarrow y \in b \wedge (x, y) \in w) \right. \right. \\ \left. \left. \wedge (x \in b \Rightarrow y \in a \wedge (y, x) \in w) \right) \right) \\ \wedge \forall x \forall y \forall z \left( ((x, y) \in w \wedge (x, z) \in w \wedge x \in a \Rightarrow y = z \wedge y \in b) \right. \\ \left. \wedge ((x, z) \in w \wedge (y, z) \in w \wedge z \in b \Rightarrow x = y \wedge x \in a) \right).$$

Eşitlik gibi eşleniklik, bir denklik bağıntısıdır (21 numaralı sayfaya bakın):

**Teorem 68.** *Tüm  $a$ ,  $b$ , ve  $c$  kümeleri için*

$$a \approx a, \quad a \approx b \Rightarrow b \approx a, \quad a \approx b \wedge b \approx c \Rightarrow a \approx c$$

*cümleleri doğrudur.*

**Alıştırma 39.** Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 69.**  *$a$ , bir  $\mathbf{S}$  bağıntısı tarafından iyi sıralanmış bir küme olsun. O zaman bir ve tek bir  $\beta$  için,  $a$  kümesinden  $\beta$  ordinaline giden*

$$x \mathbf{S} y \Leftrightarrow f(x) < f(y)$$

*koşulunu sağlayan bir  $f$  eşlemesi vardır.*

**Kanıt.** 58 numaralı Özyineleme Teoreminde  $a$  kümesi, **ON** sınıfının yerini alabilir. Yani tanım kümesi  $a$  olan ve

$$f(b) = \{f(c) : c \in a \wedge c \mathbf{S} b\}$$

koşulunu sağlayan bir  $f$  göndermesi vardır. O zaman  $a$  kümesinin her  $b$  elemanı için  $f(b)$  bir ordinaldir. Zira değilse  $b$ ,  $f(b)$  değeri ordinal olmayan

$a$  kümesinin en küçük elemanı olsun. O zaman  $f(b) \subseteq \mathbf{ON}$ , ve ayrıca  $f(b)$  geçişlidir, dolayısıyla  $f(b)$  bir ordinal olmalıdır. Aynı şekilde  $f[a]$  bir ordinaldir. Eğer  $f_0$  ile  $f_1$ , aynı koşulu sağlar, ve

$$f_0 \upharpoonright \{c \in a: c \mathbf{S} b\} = f_1 \upharpoonright \{c \in a: c \mathbf{S} b\}$$

ise, o zaman  $f_0(b) = f_1(b)$ ; öyleyse  $f_0 = f_1$ .  $\square$

**Teorem 70.** *Tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için  $a \times b$  çarpımı, bir kümedir.*

*Kanıt.* Yerleştirme Aksiyomuna göre her  $c$  için  $a \times \{c\}$  bir kümedir, dolayısıyla bir  $\{a \times \{x\}: x \in b\}$  sınıfı vardır, ve bu sınıf da bir kümedir. Ayrıca

$$a \times b = \bigcup \{a \times \{x\}: x \in b\},$$

ve Bileşim Aksiyomuna göre bu bileşim, bir kümedir.  $\square$

Tekrar  $a$ ,  $s$ , ve  $\beta$ , 69 numaralı teoremdeki gibi olsun.  $(a, \mathbf{S} \cap (a \times a))$  sıralı ikilisi,

$$(a, \mathbf{S})$$

olarak yazılabilir. O zaman  $\beta$ ,  $(a, \mathbf{S})$  ikilisinin **ordinalidir** ( $\beta$  is the ordinal of  $(a, \mathbf{S})$ ), ve

$$\beta = \text{ord}(a, \mathbf{S})$$

yazabiliriz. O halde

$$a \approx \text{ord}(a, \mathbf{S}).$$

Tanıma göre

$$\text{kard}(a) = \min\{\beta: a \approx \beta\};$$

bu ordinal,  $a$  kümesinin **kardinalidir** (*cardinal*). Öyleyse her *iyi sıralanabilir* kümenin kardinali vardır. Özel olarak her ordinalin kardinali vardır. Kardinaler, bir

### KN

sınıfını oluşturur. O zaman  $\mathbf{KN} \subseteq \mathbf{ON}$ .  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$  ve  $\nu$  küçük Yunan harfleri, her zaman kardinaleri gösterecektir.

Aslında 9 numaralı sayfadaki Seçim Aksiyomuna göre her küme iyi sıralanabilir; ama şu anda bu aksiyom, resmi askiyomlarımızdan biri değildir.

## 5.2 Sonlu kümeler

Bir doğal sayıyla eşlenik bir küme, **sonludur** (*finite*); sonlu olmayan bir sınıf, **sonsuzdur** (*infinite*). O zaman her sonlu kardinal, bir doğal sayıdır.

Birkaç tane von Neumann doğal sayısının tanımını, 5 ve 29 numaralı sayfalardan hatırlayalım:

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}, \quad 4 = \{0, 1, 2, 3\}.$$

Bir  $a$  kümesinin

- 1) hiçbir elemanı yoksa, o zaman  $a \approx 0$ ; aslında  $a = 0$ ;
- 2) tek bir elemanı varsa, o zaman  $a \approx 1$ ;
- 3) iki (ve sadece iki) elemanı varsa, o zaman  $a \approx 2$ ;
- 4) üç (ve sadece üç) elemanı varsa, o zaman  $a \approx 3$ .

Ayrıca

$$0 \not\approx 1, \quad 0 \not\approx 2, \quad 0 \not\approx 3, \quad 1 \not\approx 2, \quad 1 \not\approx 3, \quad 2 \not\approx 3.$$

Ancak herhangi iki eşlenik doğal sayı eşit olmalı mı? Bu soruyu, 1 numaralı sayfada sormuştuk.

**Teorem 71.** *Her doğal sayı, ya 0 ya bir doğal sayının ardıdır.*

*Alıştırma 40.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 72.** *İki doğal sayı birbiriyle eşlenirse, birbirine eşittir:*

$$\forall x \forall y (x \in \omega \wedge y \in \omega \wedge x \approx y \Rightarrow x = y).$$

*Yani her doğal sayı, sonlu bir kardinaldir.*

*Kanıt.* Tümevarımla her  $n$  doğal sayısı için

$$\forall x (x \in \omega \wedge x \approx n \Rightarrow x = n)$$

cümlesini kanıtlayacağız.  $n = 0$  ise doğrudur.  $n = m$  ise doğru olsun, ve bir  $\ell$  doğal sayısı için  $m' \approx \ell$  olsun. O zaman  $\ell$  boş değil. Son teoreme göre  $\ell$  bir ardıl olmalı.  $\ell = k'$  olsun.  $m'$  sayısından  $k'$  sayısına giden bir

$f$  eşlemesi vardır. Eğer  $f(m) = k$ , o zaman  $f \setminus \{(m, k)\}$ ,  $m$  sayısından  $k$  sayısına giden bir eşlemedir. Eğer  $f(m) \neq k$ , o zaman

$$\{(x, y) : x \in m \setminus \{f^{-1}(k)\} \wedge y = f(x)\} \cup \{(f^{-1}(k), f(m))\}$$

bağıntısı,  $m$  sayısından  $k$  sayısına giden bir eşlemedir. Öyleyse her durumda  $m \approx k$ . Hipotezimize göre  $m = k$  olmalı, dolayısıyla  $m' = \ell$ . Kanıt bitti.  $\square$

Kısaca  $\omega \subseteq \mathbf{KN}$ .

### 5.3 Sayılabilme

Tekrar  $F: A \rightarrow B$  olsun.

1. Eğer  $F[A] = B$  ise, o zaman  $F$ ,  $B$  sınıfını **örten** bir göndermedir ( $F$  is onto  $B$ ), ve

$$F: A \twoheadrightarrow B$$

ifadesini yazabiliriz.

2. Eğer

$$\forall x \forall y (x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \Rightarrow x = y)$$

ise, o zaman  $F$ , **birebir** (*one-to-one*) veya **injektif** (*injective*) bir göndermedir; ayrıca  $F$ , bir **gömmedir** (*embedding*). Bu durumda

$$F: A \hookrightarrow B \quad \text{veya} \quad F: A \overset{\hookrightarrow}{\rightarrow} B$$

ifadesini yazabiliriz. Bir  $a$  kümesinden  $B$  sınıfına giden bir gömme varsa, bu gömme de bir kümedir, ve

$$a \preccurlyeq B$$

ifadesini yazarız.

3. Eğer  $F$ ,  $B$  sınıfını örten bir gömmeysen, o zaman

$$F: A \overset{\approx}{\rightarrow} B$$

ifadesini yazarız.\* Bu durumda  $F$ , bir eşlemedir.

---

\*  $F: A \twoheadrightarrow B$  ifadesi de mümkündür.

**Teorem 73.** *Tüm  $a$ ,  $b$ , ve  $c$  kümeleri için*

$$a \preccurlyeq a, \quad a \preccurlyeq b \wedge b \preccurlyeq c \Rightarrow a \preccurlyeq c, \quad a \approx b \Rightarrow a \preccurlyeq b$$

*cümleleri doğrudur.*

*Alıştırma 41.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 74.** *Bir sınıf, bir kümeye gömülebilirse, bu sınıf da bir kümedir.*

*Alıştırma 42.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 75.**  $\omega$ , bir kardinaldir, yani

$$\omega \in \mathbf{KN}.$$

*Kanıt.* Tümevarımla her  $m$  doğal sayısı için  $f: m \rightarrow \omega$  ise  $f[m]$  kümesinin en büyük  $n$  elemanı vardır, dolayısıyla  $n + 1 \in \omega \setminus f[m]$ ; özel olarak  $f$ ,  $\omega$  kümesini örten değildir.  $\square$

Teoremin sonucu olarak  $\omega$  kümesiyle eşlenik her küme, sonsuzdur. Öyle bir küme, **sayılabilir sonsuzluktadır** (*countably infinite*). Sonlu veya sayılabilir sonsuzluktaki bir küme, **sayılabilir** (*countable*). Diğer kümeler ve sınıflar, **sayılamaz sonsuzluktadır** (*uncountably infinite*) veya **sayılamaz** (*uncountable*). Aslında her küme olmayan sınıf, sayılamaz.

**Teorem 76.** *Bir  $a$  kümesi için aşağıdaki koşullar, birbirine denktir.*

1.  $a$  sayılabilir.
2.  $a \preccurlyeq \omega$ .
3. Ya  $a$  boş, ya da  $\omega$  kümesinden  $a$  kümesini örten bir gönderme vardır.

*Kanıt.* Eğer  $f: a \xrightarrow{\sim} \omega$  ise, o zaman  $f: a \xrightarrow{\preccurlyeq} \omega$  ve  $f^{-1}: \omega \rightarrow a$ .

Eğer  $n \in \omega$  ve  $f: a \xrightarrow{\sim} n$  ise, o zaman  $f: a \xrightarrow{\preccurlyeq} \omega$ ; ayrıca ya  $n = 0$  ya da

$$f^{-1} \cup \{(x, 0) : n \leq x < \omega\} : \omega \rightarrow a.$$



Şimdi  $f: a \xrightarrow{\simeq} \omega$  olsun. O zaman  $f[a]$ ,  $\in$  tarafından iyi sıralanmıştır, dolayısıyla 69 numaralı teoreme göre  $f[a]$  kümesinden bir  $\alpha$  ordinaline giden ve

$$x \in y \Leftrightarrow g(x) \in g(y)$$

koşulunu sağlayan bir  $g$  eşlemesi vardır. Teoremin kanıtındaki gibi  $f[a]$  kümesinin tüm  $n$  elemanları için

$$g(n) = \{g(k) : k \in f[a] \cap n\}.$$

Eğer  $f[a] \cap n$  kümesinin tüm  $k$  elemanı için  $g(k) \leq k$  ise, o zaman  $g(n) \leq n$ . Sonuç olarak,  $f[a]$  kümesi iyi sıralanmış olduğundan her  $n$  elemanı için  $g(n) \leq n$ , dolayısıyla  $\alpha \leq \omega$  ve  $g \circ f: a \xrightarrow{\simeq} \alpha$ .

Son olarak  $h: \omega \rightarrow a$  olsun. O zaman

$$x \mapsto \min\{y \in \omega : h(y) = x\} : a \xrightarrow{\simeq} \omega,$$

dolayısıyla, gösterdiğimiz gibi,  $a$  sayılabilir. □

Sayılamaz sonsuzlukta bir küme biliyor muyuz?

### 5.3.1 Toplama

Toplama veya ikili bileşim işlemiyle sayılamaz sonsuzlukta kümeler oluşturulamaz.

Tanıma göre tüm  $a$  ile  $b$  kümeleri için

$$a \sqcup b = (a \times \{0\}) \cup (b \times \{1\}).$$

Bu bileşim,  $a$  ile  $b$  kümelerinin **ayrık bileşimidir** (*disjoint union*).

**Teorem 77.** *Tüm  $\alpha$  ile  $\beta$  ordinaleri için*

$$\alpha + \beta \approx \alpha \sqcup \beta.$$

*Kanıt.* Bu kanıt için tümevarım kullanmayacağız.  $\alpha \leq \gamma$  ise  $\mathbf{F}(\gamma)$ ,

$$\alpha + x = \gamma$$

denkleminin tek çözümü olsun. O zaman

$$\{(x, (x, 0)) : x < \alpha\} \cup \{(x, (\mathbf{F}(x), 1)) : \alpha \leq x < \alpha + \beta\},$$

$\alpha + \beta$  toplamından  $(\alpha \times \{0\}) \cup (\beta \times \{1\})$  bileşimine giden bir eşlemedir.  $\square$

**Teorem 78.**  $\omega + \omega \approx \omega$ .

*Kanıt.*  $(x, y) \mapsto 2x + y$  göndermesi,  $(\omega \times \{0\}) \cup (\omega \times \{1\})$  bileşiminden  $\omega$  kümesine giden bir eşlemedir.  $\square$

**Teorem 79.**  $\alpha \approx \beta$  ve  $\gamma \approx \delta$  ise  $\alpha + \gamma \approx \beta + \delta$ .

*Alıştırma 43.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 80.**  $a$  ile  $b$  sayılabilirse  $a \cup b$  bileşimi de sayılabilir.

*Alıştırma 44.* Teoremi kanıtlayın.

### 5.3.2 Çarpma

Çarpma ile sayılamaz sonsuzluktaki kümeler oluşturulamaz.

**Teorem 81.** Tüm  $\alpha$  ile  $\beta$  ordinalleri için

$$\alpha \cdot \beta \approx \alpha \times \beta.$$

*Kanıt.* Eşleme,  $\{(x, (y, z)) : x < \alpha \cdot \beta \wedge y < \alpha \wedge x = \alpha \cdot z + y\}$ .  $\square$

**Teorem 82.**  $\omega \cdot \omega \approx \omega$ .

*Kanıt.*  $\{(x, (y, z)) : (x > y \Rightarrow z = x^2 + y) \wedge (x \leq y \Rightarrow z = x^2 + x + y)\}$  sınıfı,  $\omega \times \omega$  çarpımından  $\omega$  kümesine giden bir eşleme tanımlar.  $\square$

**Teorem 83.**  $\alpha \approx \beta$  ve  $\gamma \approx \delta$  ise  $\alpha \cdot \gamma \approx \beta \cdot \delta$ .

*Alıştırma 45.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 84.**  $a$  ile  $b$  sayılabilirse  $a \times b$  çarpımı da sayılabilir.

*Alıştırma 46.* Teoremi kanıtlayın.

### 5.3.3 Kuvvet alma

*Ordinal* kuvvetleri alarak sonsuzluktaki kümeler oluşturulamaz.

Tüm  $\alpha$  ile  $\beta$  ordinalleri için, tanım kümesi  $\beta$  ordinalinin sonlu bir altkümeye olan ve değer kümesi  $\alpha$  ordinalinin bir altkümeye olan göndermelerin sınıfı,

$$\exp(\alpha, \beta)$$

olsun.\*

**Teorem 85.** *Tüm  $\alpha$  ile  $\beta$  ordinalleri için*

$$\alpha^\beta \approx \exp(\alpha, \beta).$$

*Kanıt.*  $\gamma_\alpha$ , 59 numaralı teoremdeki gibi olunca,  $\{(\gamma, \gamma_\alpha) : \gamma < \alpha^\beta\}$  kümesi,  $\alpha^\beta$  kümesinden  $\exp(\alpha, \beta)$  kümesine giden bir eşlemedir.  $\square$

**Teorem 86.**  $\alpha \approx \beta$  ve  $\gamma \approx \delta$  ise  $\alpha^\gamma \approx \beta^\delta$ .

*Alıştırma 47.* Teoremi kanıtlayın.

$n \in \omega$  ise  ${}^n b$  sınıfının bir elemanı,  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  olarak yazılabilir. O halde

$$f = (a_0, \dots, a_{n-1}) \Rightarrow f(i) = a_i.$$

Herhangi bir  $\mathbf{A}$  sınıfı için

$$\mathcal{P}_\omega(\mathbf{A}),$$

$\mathbf{A}$  sınıfının *sonlu* altkümelerinin sınıfı olsun.

**Teorem 87.**  $\omega^\omega \approx \omega$ .

*Kanıt.*  $\omega^\omega \approx \exp(\omega, \omega)$ , ve  $\exp(\omega, \omega) \subseteq \mathcal{P}_\omega(\omega \times \omega)$ . Ayrıca  $\omega \times \omega \approx \omega$  olduğundan  $\mathcal{P}_\omega(\omega \times \omega) \approx \mathcal{P}_\omega(\omega)$ . Kısaca

$$\omega^\omega \approx \exp(\omega, \omega) \subseteq \mathcal{P}_\omega(\omega \times \omega) \approx \mathcal{P}_\omega(\omega).$$

---

\* $\exp(\alpha, \beta)$  ifadesi, ve aşağıdaki 85 numaralı teorem, Levy'nin [13, IV.2.10] kitabından alınmıştır.

Şimdi  $f: \omega \times \omega \xrightarrow{\cong} \omega$  olsun. Özyinelemeyle  $\omega \setminus \{0\}$  kümesinde bir  $n \mapsto g_n$  göndermesini tanımlayacağız. Aslında  $g_n: {}^n\omega \rightarrow \omega$  olacaktır. Özyineli tanıma göre

$$g_1((x)) = x, \quad g_{n+1}((x_0, \dots, x_n)) = f((x_0, \dots, x_{n-1}), x_n).$$

Tümevarımdan  $1 \leq n < \omega$  ise  $g_n: {}^n\omega \xrightarrow{\cong} \omega$ , dolayısıyla  ${}^n\omega$  ile  $g_n$  sınıfları, kümedir.

$\mathcal{P}_\omega(\omega)$  sınıfından  $\bigcup\{{}^n\omega: n \in \omega\}$  bileşimine giden öyle bir  $h$  göndermesi vardır ki  $h(0) = 0$ , ve  $a_0 < a_1 < \dots < a_n < \omega$  ise

$$h(\{a_0, a_1, \dots, a_n\}) = (a_0, \dots, a_n).$$

Öyleyse  $h$ , bir gömmedir. Ayrıca

$$(b_0, \dots, b_{n-1}) \mapsto f\left(n, g_n((b_0, \dots, b_{n-1}))\right)$$

göndermesi,  $\bigcup\{{}^n\omega: n \in \omega\}$  bileşiminden  $\omega$  kümesine giden bir gömmedir. Kısaca

$$\mathcal{P}_\omega(\omega) \preccurlyeq \bigcup\{{}^n\omega: n \in \omega\} \preccurlyeq \omega.$$

Gösterdiklerimiz hep birlikte  $\omega^\omega$  kümesinden  $\omega$  kümesine giden bir gömme olduğunu kanıtlar.  $\square$

## 5.4 Büyüklük

Bir  $a$  kümesinden bir  $\mathbf{B}$  sınıfına giden bir gömme varsa, ama eşleme yoksa,

$$a \prec \mathbf{B}$$

ifadesini yazarız. Öyleyse

$$a \prec \mathbf{B} \text{ denktir } a \preccurlyeq \mathbf{B} \wedge a \not\approx \mathbf{B}.$$

O zaman bir  $a$  kümesi sonludur ancak ve ancak  $a \prec \omega$ . 73 numaralı teoremin özel durumu vardır:

$$a \prec b \wedge b \prec c \Rightarrow a \preccurlyeq c.$$

Ama  $a \prec b \wedge b \prec c$  ise  $a \prec c$  sonucuna varabilir miyiz?

Bir  $a$  kümesinin **büyüklüğü** (size),  $\{x: x \approx a\}$  denklik sınıfı olarak düşünülebilir.  $a$  boş değilse  $\{x: x \approx a\}$  sınıfı, küme değildir. Hâlâ büyüklüklerin sıralanabilir olup olmadığını sorabiliriz. Eğer  $a \prec b$  ise, o zaman  $\{x: x \approx a\}$  büyüklüğü,  $\{x: x \approx b\}$  büyüklüğünden küçük gibidir; ama  $\mathbf{A}$  küçük  $\mathbf{B}$  ve  $\mathbf{B}$  küçük  $\mathbf{C}$  ise  $\mathbf{A}$  küçük  $\mathbf{C}$  doğru mudur?

Her küme iyi sıralanabilirse, o zaman her büyüklük, bir ve tek bir kardinal içerir, dolayısıyla büyüklükler, içerilen kardinallere göre sıralanabilir. Aslında, aşağıda göreceğimiz gibi, Seçim Aksiyomunu kullanmadan büyüklükler hâlâ sıralanabilir, ancak *iyi* sıralanamaz.

**Teorem 88** (Schröder–Bernstein). *Tüm  $a$  ve  $b$  kümeleri için*

$$a \preceq b \wedge b \preceq a \Rightarrow a \approx b.$$

*Kanıt* (Zermelo [28]).  $f: a \rightarrow b$  ve  $g: b \rightarrow a$  olsun. Bu durumda

$$(g \circ f)[a] \subseteq g[b] \subseteq a, \quad g[b] \approx b.$$

Biz  $a \approx g[b]$  eşlenikliğini kanıtlayacağız. Sonuç olarak  $a \approx b$  olacaktır.

$a$  kümesinden  $g[b]$  kümesine giden bir  $h$  eşlemesini tanımlayabilirsek, herhalde  $a$  kümesinin bir  $c$  altkümeleri için

$$h = \{(x, x): x \in c\} \cup \{(x, (g \circ f)(x)): x \in a \setminus c\} \quad (*)$$

olacaktır. O halde

$$c \cup (g \circ f)[a \setminus c] = g[b] \quad (\dagger)$$

olmalıdır, çünkü  $h[a] = g[b]$  olacaktır. Ayrıca

$$c \cap (g \circ f)[a \setminus c] = \emptyset \quad (\ddagger)$$

olmalıdır, çünkü  $h$  bir gömme olacaktır. O zaman

$$c = g[b] \setminus (g \circ f)[a \setminus c]$$

olmalıdır.  $g \circ f$  birebir olduğundan

$$(g \circ f)[a \setminus c] = (g \circ f)[a] \setminus (g \circ f)[c],$$

dolayısıyla

$$c = g[b] \setminus ((g \circ f)[a] \setminus (g \circ f)[c])$$

olmalıdır.  $(g \circ f)[c] \subseteq (g \circ f)[a] \subseteq g[b]$  olduğundan

$$c = (g[b] \setminus (g \circ f)[a]) \cup (g \circ f)[c] \quad (\S)$$

olmalıdır. Ters olarak, eğer  $c$ ,  $(\S)$  satırındaki gibiyse, o zaman  $(\dagger)$  ile  $(\ddagger)$  satırları doğrudur, ve sonuç olarak,  $g \circ f$  birebir olduğundan,  $(*)$  satırındaki gibi  $h$  göndermesi,  $a$  kümesinden  $g[b]$  kümesine giden bir eşlemedir.

Şimdi öyle bir  $c$  kümesini bulmalıyız. O zaman

$$\mathbf{A} = \{x: (g[b] \setminus (g \circ f)[a]) \cup (g \circ f)[x] \subseteq x \subseteq a\}$$

olsun. Bu durumda  $a \in \mathbf{A}$ , dolayısıyla  $\bigcap \mathbf{A}$  bir küme olmalıdır. Bu küme  $c$  olsun. O zaman  $c \in \mathbf{A}$  olmalıdır (neden?). Eğer  $(\S)$  satırı yanlış ise, o zaman

$$d \in c \setminus \left( (g[b] \setminus (g \circ f)[a]) \cup (g \circ f)[c] \right)$$

cümlesini sağlayan bir  $d$  vardır. Bu durumda

$$c \setminus \{d\} \in \mathbf{A}, \quad \bigcap \mathbf{A} \subseteq c \setminus \{d\}, \quad c \subseteq c \setminus \{d\}, \quad d \notin c.$$

Bu bir çelişkidir. O zaman  $(\S)$  satırı doğru olmalıdır, ve  $a \approx g[b]$ , dolayısıyla  $a \approx b$ .  $\square$

**Teorem 89.** *Tüm  $a$ ,  $b$ , ve  $c$  kümeleri için*

$$a \prec b \wedge b \prec c \Rightarrow a \prec c.$$

*Alıştırma 48.* Teoremi kanıtlayın.

## 5.5 Sayılamaz sonsuzluk

**Teorem 90** (Cantor). *Her  $a$  kümesi için*

$$a \prec \mathcal{P}(a).$$

*Kanıt.*  $\{(x, \{x\}) : x \in a\}$  göndermesinin sayesinde  $a \approx \mathcal{P}(a)$ . Şimdi  $f: a \rightarrow \mathcal{P}(a)$  ve

$$b = \{x \in a : x \notin f(x)\}$$

olsun. O zaman  $a$  kümesinin her  $c$  elemanı için

$$c \in b \Leftrightarrow c \notin f(c).$$

Öyleyse  $b \neq f(c)$ . Dolayısıyla  $b \notin f[a]$ , ve  $f$ , eşleme değildir. O zaman  $a \not\approx \mathcal{P}(a)$ .  $\square$

Cantor'un Teoremi, küme olmayan sınıflar için yanlıştır. Mesela

$$\mathbf{V} \approx \mathcal{P}(\mathbf{V});$$

aslında  $\mathbf{V} = \mathcal{P}(\mathbf{V})$ .

*Alıştırma 49.* Cantor'un Teoreminin kanıtında,  $a$  kümesinin küme olduğunu nasıl kullandık?

Sonsuz bir kümenin kuvvet sınıfı bir kümeysen, bu küme sayılamaz.

**AKSİYOM 8** (Kuvvet Kümesi). *Her kümenin kuvvet sınıfı, bir kümedir, yani*

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \Leftrightarrow \forall w (w \in z \Rightarrow w \in x))$$

*cümlesi doğrudur.*

**Teorem 91** (Hartogs). *Her küme için, bu kümeye gömülemeyen bir ordinal vardır.*

*Kanıt.*  $a$  bir küme olsun, ve  $b$ ,  $\mathcal{P}(a) \times \mathcal{P}(a \times a)$  çarpımın öyle bir altkümesi olsun ki çarpımın her  $(c, s)$  elemanı için

$$(c, s) \in b \Leftrightarrow s, c \text{ kümesini iyi sıralar.}$$

Eğer  $(c, s) \in b$  ve  $\alpha < \text{ord}(c, s)$  ise,  $c$  kümesinin bir  $d$  altkümesi için

$$\text{ord}(d, s) = \alpha.$$

Öyleyse  $\{\text{ord}(c, s) : (c, s) \in b\}$  geçişlidir, dolayısıyla bir  $\beta$  ordinaline eşittir. O zaman  $\beta$ ,  $a$  kümesine gömülemez. Aslında  $f: \beta \xrightarrow{\cong} a$  ise

$$c = f[\beta], \quad s = \{(f(x), f(y)) : x < y < \beta\}$$

olsun. O zaman  $(c, s) \in b$  ve  $\text{ord}(c, s) = \beta$ , dolayısıyla  $\beta \in \beta$ , ki bu imkânsızdır.  $\square$

Şimdi her  $\kappa$  kardinali için, bu kardinale gömülemeyen *en küçük* ordinal vardır. Bu ordinal, bir kardinal olmalıdır. Bu kardinale,  $\kappa$  kardinalinin **ardılı** (veya *kardinal ardılı*) denir, ve bu ardıl

$$\kappa^+$$

ifadesiyle gösterilir. Böylece  $\kappa < \kappa^+$ , ve her  $\lambda$  kardinali için ya  $\lambda \leq \kappa$  ya da  $\kappa^+ \leq \lambda$ .

**Teorem 92.** *Elemanları kardinal olan bir kümenin supremumu, bir kardinaldir.*

*Alıştırma 50.* Teoremi kanıtlayın.

Şimdi

$$\begin{aligned} \aleph_0 &= \omega, \\ \aleph_{\beta+1} &= (\aleph_\beta)^+, \\ \gamma \text{ limit} &\Rightarrow \aleph_\gamma = \sup\{\aleph_\xi : \xi < \gamma\} \end{aligned}$$

koşulları, **ON** sınıfında bir  $x \mapsto \aleph_x$  işlemini tanımlar. (Burada  $\aleph$ , İbranice *alef* harfidir.)

**Teorem 93.**  $\xi \mapsto \aleph_\xi$  işlemi, **KN**  $\setminus \omega$  sınıfını örten ve normal bir göndermedir.

*Alıştırma 51.* Teoremi kanıtlayın.



## 5.6 Toplama ve çarpma

Tanıma göre

$$\kappa \oplus \lambda = \text{kard}(\kappa + \lambda), \quad \kappa \otimes \lambda = \text{kard}(\kappa \cdot \lambda).$$

O zaman 77 ve 81 numaralı teoremler sayesinde

$$\kappa \oplus \lambda = \text{kard}(\kappa \sqcup \lambda), \quad \kappa \otimes \lambda = \text{kard}(\kappa \times \lambda).$$

Sonraki teoremler sayesinde kardinal hesapmaları kolaydır.

**Teorem 94.** *Tüm  $\kappa$  ile  $\lambda$  kardinalleri için*

$$\kappa \oplus \lambda = \lambda \oplus \kappa, \quad \kappa \otimes \lambda = \lambda \otimes \kappa.$$

*Alıştırma 52.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 95.**  $2 \leq \kappa \leq \lambda$  ise

$$\lambda \leq \kappa \oplus \lambda \leq \kappa \otimes \lambda \leq \lambda \otimes \lambda.$$

*Alıştırma 53.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 96.**  $\mathbf{F}$ , ordinallerde bir normal işlem, ve

$$\alpha \approx \beta \Rightarrow \mathbf{F}(\alpha) \approx \mathbf{F}(\beta) \quad (\heartsuit)$$

ise, o zaman tüm sonsuz  $\kappa$  kardinali için

$$\mathbf{F}(\kappa) = \kappa.$$

*Kanıt.*  $\mathbf{F}$  kesin artan olduğundan, 55 numaralı teorem sayesinde  $\kappa \leq \mathbf{F}(\kappa)$ . Mümkünse  $\kappa < \mathbf{F}(\kappa)$  olsun.  $\kappa$  bir ordinal ardılı (neden?) ve  $\mathbf{F}$  normal olduğundan bir  $\alpha$  için  $\kappa < \mathbf{F}(\alpha)$ . O halde  $\lambda = \text{kard}(\alpha)$  ise,  $(\heartsuit)$  satırındaki koşula göre

$$\lambda < \kappa \leq \mathbf{F}(\lambda).$$

Böylece  $\{x: x \in \mathbf{KN} \wedge x < \mathbf{F}(x)\}$  sınıfının en küçük elemanı yoktur, dolayısıyla sınıf boştur.  $\square$

**Teorem 97.**  $\lambda$  sonsuz ise

$$\lambda = \lambda \otimes \lambda.$$

*Kanıt.*  $\mathbf{ON} \times \mathbf{ON}$  çarpımı, öyle bir  $<$  bağıntısı tarafından iyi sıralanır ki

$$\text{maks}(\alpha, \beta) < \text{maks}(\gamma, \delta) \Rightarrow (\alpha, \beta) < (\gamma, \delta).$$

Mesela

$$\begin{aligned} (\alpha, \beta) < (\gamma, \delta) \Leftrightarrow & \text{maks}(\alpha, \beta) < \text{maks}(\gamma, \delta) \vee \beta < \delta < \gamma = \alpha \\ & \vee (\beta < \alpha = \delta \wedge \gamma \leq \delta) \vee \alpha < \gamma \leq \delta = \beta \end{aligned}$$

olsun, onun için

$$\alpha \times \alpha = \{(x, y) : (x, y) \in \mathbf{ON} \times \mathbf{ON} \wedge (x, y) < (\alpha, 0)\}.$$

O zaman  $\xi \mapsto \text{ord}(\xi \times \xi, <)$  göndermesi, son teoremdeki gibi bir  $\mathbf{F}$  işlemidir, dolayısıyla her sonsuz  $\lambda$  için  $\lambda = \mathbf{F}(\lambda)$ , ve özel olarak  $\lambda \approx \lambda \times \lambda$ .  $\square$

Sonuç olarak

$$\aleph_\beta \oplus \aleph_\gamma = \aleph_\beta \otimes \aleph_\gamma = \aleph_{\text{maks}(\alpha, \beta)}.$$

## 5.7 Ordinaler Kuvvetlerinin kardinalleri

**Teorem 98.**  $\alpha$  sonsuz ise

$$\mathcal{P}_\omega(\alpha) \approx \alpha^\omega \approx \alpha.$$

*Kanıt.* Eğer  $\omega \leq \alpha$  ise, 87 numaralı teoremin kanıtındaki gibi

$$\alpha \preccurlyeq \alpha^\omega \approx \exp(\alpha, \omega) \subseteq \mathcal{P}_\omega(\alpha \times \omega) \approx \mathcal{P}_\omega(\alpha) \preccurlyeq \bigcup \{^x \alpha : x \in \omega\} \preccurlyeq \alpha$$

çünkü  $\alpha \times \omega \approx \alpha$  ve  $\alpha \times \alpha \approx \alpha$ .  $\square$

**Teorem 99.**  $\alpha$  ile  $\beta$  sonsuz ise

$$\alpha^\beta \approx \text{maks}(\alpha, \beta).$$

*Kanıt.* Eğer  $\{(\gamma_0, \delta_0), \dots, (\gamma_{n-1}, \delta_{n-1})\} \in \exp(\alpha, \beta)$  ve  $\gamma_0 < \dots < \gamma_{n-1}$  ise, o zaman

$$f\left(\{(\gamma_0, \delta_0), \dots, (\gamma_{n-1}, \delta_{n-1})\}\right) = (\{\gamma_0, \dots, \gamma_{n-1}\}, \{\delta_0, \dots, \delta_{n-1}\})$$

olsun. O halde  $f: \exp(\alpha, \beta) \xrightarrow{\cong} \mathcal{P}_\omega(\beta) \times \exp(\alpha, \omega)$ , dolayısıyla

$$\alpha^\beta \approx \exp(\alpha, \beta) \cong \mathcal{P}_\omega(\beta) \times \exp(\alpha, \omega) \approx \beta \times \alpha \approx \text{maks}(\alpha, \beta). \quad \square$$

## 5.8 Kontinü Hipotezi

$\mathbb{N} = \{x \in \omega : x \geq 1\}$  olsun, ve  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  çarpımında  $\sim$ ,

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

koşulunu sağlayan ikili bir bağıntı olsun. O zaman  $\sim$  bir denklik bağıntı-sıdır.  $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  ise

$$a/b = \frac{a}{b} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (x, y) \sim (a, b)\}$$

olsun, ve

$$\mathbb{Q}^+ = \{x/y : (x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}$$

olsun. O zaman  $x \mapsto x/1$  göndermesi,  $\mathbb{N}$  kümesini  $\mathbb{Q}^+$  kümesine gömer. İlkokulda öğrendiğimiz gibi  $\mathbb{Q}^+$  kümesinde

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

ve

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d < b \cdot c$$

tanımları yapılabilir. O zaman  $<$ ,  $\mathbb{Q}^+$  kümesinin doğrusal sıralamasıdır, ve burada  $a < b$  ise

$$a < \frac{2a + b}{3} < \frac{a + 2b}{3} < b.$$

Şimdi  $\mathbb{R}^+$ ,

$$\begin{aligned} 0 &\subset a \subset \mathbb{Q}^+, \\ x < y \wedge y \in a &\Rightarrow x \in a, \\ y \in a &\Rightarrow \exists z (y < z \wedge z \in a) \end{aligned}$$

koşullarını sağlayan  $a$  kümelerinin kümesi olsun. Bu  $\mathbb{R}^+$  kümesine **kontinü** (*continuum*) denebilir.

**Teorem 100.**  $\mathbb{R}^+ \approx \mathcal{P}(\omega)$ .

*Kanıt.*  $n \in \omega$  ve  $\sigma \in {}^n 2$  ise

$$f(\sigma) = 1 + \sum_{\xi < n} \frac{2\sigma(\xi)}{3^\xi}$$

olsun. Yani  $f(0) = 1$  olsun, ve  $\sigma \in {}^m 2$  ise

$$f(\sigma \cup \{(m, 0)\}) = a_\sigma, \quad f(\sigma \cup \{(m, 1)\}) = a_\sigma + 2/3^m$$

olsun. Şimdi  $\sigma \in {}^\omega 2$  ise

$$g(\sigma) = \left\{ x \in \mathbb{Q}^+ : \exists x (x \in \omega \wedge x < f(\sigma \upharpoonright x)) \right\}$$

olsun. O zaman  $g: {}^\omega 2 \rightarrow \mathbb{R}^+$ . Aslında  $g$  bir gömmedir, çünkü  $\sigma \upharpoonright n = \tau \upharpoonright n$  ama  $\sigma(n) = 0$  ve  $\tau(n) = 1$  ise, o zaman

$$f(\sigma) + 1/3^n \in g(\tau) \setminus g(\sigma).$$

Ayrıca  $\mathbb{Q}^+ \approx \omega$  ve  $\mathbb{R}^+ \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q}^+)$ , dolayısıyla

$${}^\omega 2 \preccurlyeq \mathbb{R}^+ \preccurlyeq \mathcal{P}(\mathbb{Q}^+) \approx \mathcal{P}(\omega) \approx {}^\omega 2.$$

Schröder–Bernstein Teoremine göre  ${}^\omega 2 \approx \mathbb{R}^+$ . □

**Kontinü Hipotezi** (*Continuum Hypothesis*) veya KH,

$$\aleph_1 \approx \mathcal{P}(\omega)$$

cümlesidir. **Genelleştirilmiş Kontinü Hipotezi** (*Generalized Continuum Hypothesis*) veya GKH,

$$\forall x \forall y (\omega \preceq x \prec y \preceq \mathcal{P}(x) \Rightarrow y \approx \mathcal{P}(x))$$

cümlesidir. GKH  $\Rightarrow$  KH gerektirmesinin doğruluğu, apaçık değildir.

Sonraki teorem için

$$\mathcal{P}^0(a) = a, \quad \mathcal{P}^{n+1}(a) = \mathcal{P}(\mathcal{P}^n(a))$$

özyineli tanımını yaparız.

**Teorem 101.** GKH doğruysa, her küme iyi sıralanabilir.

*Kanıt.* Her  $a$  kümesi,  $\mathcal{P}(a \sqcup \omega)$  kümesine gömülebilir. Aslında

$$x \mapsto \{(x, 0)\}: a \xrightarrow{\cong} \mathcal{P}(a \sqcup \omega).$$

Bu nedenle  $\mathcal{P}(a \sqcup \omega)$  iyi sıralanabilirse,  $a$  kümesi de iyi sıralanabilir. Ayrıca  $a \sqcup \omega \approx a \sqcup \omega'$ , dolayısıyla

$$\mathcal{P}(a \sqcup \omega) \approx \mathcal{P}(a \sqcup \omega') \approx \mathcal{P}(a \sqcup \omega) \sqcup \mathcal{P}(a \sqcup \omega)$$

(neden?). Öyleyse  $a \approx a \sqcup a$  eşlenikliğini varsayabiliriz. O zaman Schröder-Bernstein Teoremine göre  $a \sqcup \{0\} \approx a$ , dolayısıyla her  $n$  doğal sayısı için

$$\mathcal{P}^n(a) \approx \mathcal{P}^n(a) \sqcup \mathcal{P}^n(a).$$

Şimdi  $b \preceq \mathcal{P}(a)$  olsun. O zaman

$$a \preceq b \sqcup a \preceq \mathcal{P}(a) \sqcup \mathcal{P}(a) \approx \mathcal{P}(a).$$

GKH varsayımımıza göre  $a \approx b \sqcup a$  veya  $b \sqcup a \approx \mathcal{P}(a)$ . Birinci durumda  $b \preceq a$ . İkinci durumda

$$b \sqcup a \approx \mathcal{P}(a) \sqcup \mathcal{P}(a) \approx \mathcal{P}(a) \times \mathcal{P}(a).$$

Şimdi  $f: b \sqcup a \xrightarrow{\cong} \mathcal{P}(a) \times \mathcal{P}(a)$  olsun, ve  $\pi, (x, y) \mapsto x$  göndermesi olsun. Cantor'un Teoremine göre  $\pi[f[a \times \{1\}]] = \mathcal{P}(a)$  olamaz, dolayısıyla  $\mathcal{P}(a) \setminus \pi[f[a \times \{1\}]]$  farkının  $c$  elemanı vardır. Eğer

$$d = \{x \in b: \pi \circ f(x) = c\}$$

ise, o zaman  $f[d] = \{c\} \times \mathcal{P}(a)$ , dolayısıyla

$$d \approx \mathcal{P}(a), \quad \mathcal{P}(a) \preceq b, \quad b \approx \mathcal{P}(a).$$

Kısaca  $a \sqcup a \approx a$  ve  $b \preceq \mathcal{P}(a)$  ise, ya  $b \approx \mathcal{P}(a)$  ya da  $b \preceq a$ .

Hartogs'un Teoremine göre öyle bir  $\beta$  ordinali vardır ki  $\beta \preceq \mathcal{P}^4(a)$  (neden?), ama  $a, \beta$  ordinaline gömülemez. O zaman  $\beta$ , ya  $\mathcal{P}^4(a)$ , ya  $\mathcal{P}^3(a)$ , ya  $\mathcal{P}^2(a)$ , ya  $\mathcal{P}(a)$  ile eşleniktir. Her durumda  $a \preceq \beta$ , dolayısıyla  $a$  iyi sıralanabilir.  $\square$

Her küme iyi sıralanabilirse, her kümenin ordinali vardır. Özel olarak  $\mathcal{P}(\omega)$  kümesinin  $\aleph_\beta$  ordinali vardır, ve  $\beta \neq 0$ , dolayısıyla

$$\omega \prec \aleph_1 \preceq \mathcal{P}(\omega).$$

O zaman  $GKH \Rightarrow KH$  doğrudur.

## 5.9 Kardinaller kuvvetleri

Genelleştirilmiş Kontinü Hipotezini kabul etmeyeceğiz, ama son teoremin sonucunu kabul edeceğiz. Seçim Aksiyomunun çok biçimleri vardır; ama bizim için en uygun biçimi, aşağıdadır.

**AKSIYOM 9** (Seçim). *Her küme iyi sıralanabilir.*

Her *sayılabilen* zaten iyi sıralanabildi. Şimdi her sayılamaz sonsuzluktaki küme iyi sıralanabilir, yani bundan 0 adlı bir elemanı seçilebilir, ve ondan sonra 1 adlı elemanı, vesaire.

Öyleyse her kümenin kardinali vardır. Kuvvet Kümesi Aksiyomunun sayesinde  ${}^\beta\alpha$  sınıfı bir kümedir, çünkü

$${}^\beta\alpha \subseteq \mathcal{P}(\beta \times \alpha).$$

O zaman

$$\kappa^\lambda = \text{kard}({}^\lambda\kappa)$$

tanımını yapabiliriz. (Bu kuvvet, *ordinaler* kuvveti değildir.)

**Teorem 102.** *Tüm  $\kappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ , ve  $\nu$  kardinalleri için*

$$\begin{aligned} 0 < \lambda &\Rightarrow 0^\lambda = 0, & \kappa^{\lambda \oplus \mu} &= \kappa^\lambda \otimes \kappa^\mu, \\ \kappa^0 &= 1, & \kappa^{\lambda \otimes \mu} &= (\kappa^\lambda)^\mu, \\ 1^\lambda &= 1, & \kappa \leq \mu \wedge \lambda \leq \nu &\Rightarrow \kappa^\lambda \leq \mu^\nu. \\ \kappa^1 &= \kappa, \end{aligned}$$

*Alıştırma 54.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 103.** *Her  $\kappa$  için*

$$\kappa < 2^\kappa.$$

*Alıştırma 55.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 104.**  $2 \leq \kappa$ ,  $1 \leq \lambda$ , ve  $\aleph_0 \leq \max(\kappa, \lambda)$  olsun. *O zaman*

$$\kappa \leq 2^\lambda \Rightarrow \kappa^\lambda = 2^\lambda, \quad (||)$$

$$\lambda \leq \kappa \Rightarrow \kappa \leq \kappa^\lambda \leq 2^\kappa. \quad (**)$$

*Kanıt.* Hipoteze göre  $\kappa \leq 2^\lambda$  ise  $2 \leq \kappa \leq 2^\lambda$  ve  $\lambda$  sonsuzdur, dolayısıyla

$$2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq (2^\lambda)^\lambda = 2^{\lambda \otimes \lambda} = 2^\lambda.$$

Ayrıca  $\lambda \leq \kappa$  ise  $\kappa$  sonsuzdur, dolayısıyla

$$\kappa \leq \kappa^\lambda \leq (2^\kappa)^\lambda = 2^{\kappa \otimes \lambda} = 2^\kappa. \quad \square$$

Teoremin (||) ile (\*\*) gerektirmelerinde  $\kappa \leq 2^\lambda$  ile  $\lambda \leq \kappa$  koşulları, aynı anda doğru olabilir. Bu durumda (||) gerektirmesi, diğerinden daha çok bilgi verir. Böylece (\*\*) satırındaki cümlemin yerine

$$2^\lambda < \kappa \Rightarrow \kappa \leq \kappa^\lambda \leq 2^\kappa$$

cümlesi konulabilir. Örneğin

$$2 \leq \kappa \leq 2^{\aleph_0} \Rightarrow \kappa^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0},$$

$$2^{\aleph_0} < \kappa \Rightarrow \kappa \leq \kappa^{\aleph_0} \leq 2^\kappa.$$

Şimdi  $\lambda \leq \kappa$  (veya  $2^\lambda < \kappa$ ) durumunu iki duruma böleceğiz.

**5.9.1 Kofinallık**

Sonsuz bir  $\kappa$  kardinali limit ordinal olduğundan

$$\kappa = \sup\{\xi : \xi < \kappa\} = \bigcup_{\xi < \kappa} \xi.$$

Bazen bir kardinal, kendisinden küçük bir altkümenin supremumudur. Örneğin  $\omega < \aleph_\omega$ , ama

$$\aleph_\omega = \sup\{\aleph_x : x \in \omega\}.$$

**Teorem 105.**  $b \subseteq \alpha$  olsun. Aşağıdaki koşullar, birbirine denktir.

1.  $\alpha$  limit veya 0 ise  $\alpha = \sup(b)$ , ve  $\alpha = \gamma + 1$  ise  $\gamma \in b$ .
2. Her durumda

$$\alpha = \sup_{\xi \in b}(\xi + 1) = \bigcup_{\xi \in b} \{\eta \in \alpha : \eta \leq \xi\}.$$

3.  $\alpha$  ordinalinin her  $\gamma$  elemanı için,  $b$  kümesinin  $\gamma \leq \delta$  koşulunu sağlayan bir  $\delta$  elemanı vardır.

**Alıştırma 56.** Teoremi kanıtlayın.

Teoremdeki koşullar doğruysa  $b$ ,  $\alpha$  ordinalinde **sınırsızdır** (*unbounded*).<sup>\*</sup> Örneğin bir ordinal, kendisinde sınırsızdır. Bir ordinalin sınırsız altkümelerinin en küçük kardinaline, ordinalin **kofinalliği** (*cofinality*) denir, ve bu kardinal,

$$\text{kf}(\alpha)$$

olarak yazılabilir. Yani

$$\text{kf}(\alpha) = \min\{\text{kard}(x) : x \subseteq \alpha \wedge \sup_{\eta \in x}(\eta + 1) = \alpha\}.$$

O zaman

$$\text{kf}(\alpha) \leq \alpha, \quad \text{kf}(\alpha + 1) = 1,$$

---

<sup>\*</sup>[15, 13. böl.] kaynağında  $b$ ,  $\alpha$  ordinalinin bir *kofinal* altkümesidir.



ve ayrıca\*

$$\text{kf}(\alpha) = \min \left\{ \beta : \exists f \left( f : \beta \rightarrow \alpha \wedge \sup_{\xi < \beta} (f(\xi) + 1) = \alpha \right) \right\}.$$

**Teorem 106.** Her  $\alpha$  ordinali için, kofinalliğinden giden kesin artan ve değer kümesi  $\alpha$  ordinalinde sınırsız olan bir gönderme vardır.

*Kanıt.*  $f : \text{kf}(\alpha) \rightarrow \alpha$  olsun, ve değer kümesi  $\alpha$  ordinalinde sınırsız olsun. O zaman  $\text{kf}(\alpha)$  kümesinde bir  $g$  göndermesinin

$$g(\beta) = \text{maks} \left( f(\beta), \sup_{\xi < \beta} (g(\xi) + 1) \right)$$

özyineli tanımı olsun. Eğer  $\beta < \text{kf}(\alpha)$  ve  $g[\beta] \subseteq \alpha$  ise, o zaman  $g[\beta]$ ,  $\alpha$  ordinalinde sınırsız olamaz, dolayısıyla  $g(\beta) \in \alpha$ ; ayrıca  $f(\beta) \leq g(\beta)$ . Öyleyse  $g$ , istediğimiz gibidir.  $\square$

**Teorem 107.** Eğer  $f : \alpha \rightarrow \beta$ ,  $f$  kesin artan, ve  $f[\alpha]$ ,  $\beta$  ordinalinde sınırsız ise, o zaman

$$\text{kf}(\alpha) = \text{kf}(\beta).$$

*Kanıt.* Bir  $\gamma$  için  $g : \gamma \rightarrow \alpha$  olsun, ve  $g[\gamma]$ ,  $\alpha$  ordinalinde sınırsız olsun.  $(f \circ g)[\gamma]$  görüntüsünün  $\beta$  ordinalinde sınırsız olduğunu kanıtlayacağız.  $\delta < \beta$  olsun. Hipoteze göre  $\alpha$  ordinalinin bir  $\theta$  elemanı için

$$\delta \leq f(\theta).$$

O zaman  $\gamma$  ordinalinin bir  $\iota$  elemanı için

$$\theta \leq g(\iota), \quad \delta \leq f(\theta) \leq f(g(\iota)).$$

Öyleyse  $f \circ g$  göndermesinin değer kümesi,  $\beta$  ordinalinde sınırsızdır. Sonuç olarak

$$\text{kf}(\beta) \leq \text{kf}(\alpha).$$

Şimdi  $h : \gamma \rightarrow \beta$  olsun, ve  $h[\gamma]$ ,  $\beta$  ordinalinde sınırsız olsun.  $\delta < \gamma$  ise

$$k(\delta) = \min \{ \xi \in \alpha : h(\delta) \leq f(\xi) \}$$

---

\*Bu denklikte  $f$ , bir gönderme değişkenidir.

olsun. O zaman  $k: \gamma \rightarrow \alpha$ . Eğer  $\theta \in \alpha$  ise, o zaman  $\gamma$  ordinalinin öyle bir  $\delta$  elemanı vardır ki

$$f(\theta) \leq h(\delta) \leq f(k(\delta)), \quad \theta \leq k(\delta).$$

Öyleyse  $k[\gamma]$ ,  $\alpha$  ordinalinde sınırsızdır. Sonuç olarak  $\text{kf}(\alpha) \leq \text{kf}(\beta)$  ve aslında  $\text{kf}(\alpha) = \text{kf}(\beta)$ .  $\square$

Özel olarak  $\mathbf{F}$  normal ve  $\alpha$  limitse

$$\text{kf}(\mathbf{F}(\alpha)) = \text{kf}(\alpha).$$

Örneğin  $\alpha$  limit,  $\gamma \geq 1$ , ve  $\delta \geq 2$  ise

$$\text{kf}(\alpha) = \text{kf}(\beta + \alpha) = \text{kf}(\gamma \cdot \alpha) = \text{kf}(\delta^\alpha) = \text{kf}(\aleph_\alpha).$$

Böylece eğer Cantor normal biçiminde

$$\alpha = \omega^{\alpha_0} \cdot a_0 + \dots + \omega^{\alpha_n} \cdot a_n$$

ve  $\alpha_n > 0$  ise, o zaman

$$\text{kf}(\alpha) = \begin{cases} 1, & \text{eğer } \alpha_n = 0 \text{ ise,} \\ \text{kf}(\omega^{\alpha_n} \cdot a_n) = \text{kf}(\omega^{\alpha_n}) = \begin{cases} \omega, & \text{eğer } \alpha_n \text{ bir ardılsa,} \\ \text{kf}(\alpha_n), & \text{eğer } \alpha_n \text{ bir limitse.} \end{cases} \end{cases}$$

Bazen bu hesaplama bize yardım etmez. Mesela  $f(0) = 0$  ve  $f(n+1) = \omega^{f(n)}$  ve  $\alpha = \sup\{f[\omega]\}$  ise, yani

$$\alpha = \sup\{0, 1, \omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots\}$$

ise, o zaman  $\text{kf}(\alpha) = \omega$ , ama  $\alpha = \omega^\alpha$ .

**Teorem 108.** Her  $\alpha$  ordinali için

$$\text{kf}(\aleph_{\alpha+1}) = \aleph_{\alpha+1}.$$

*Kanıt.*  $\beta < \aleph_{\alpha+1}$  ve  $f: \beta \rightarrow \aleph_{\alpha+1}$  olsun. O zaman

$$\sup\{f[\beta]\} = \bigcup_{\xi < \beta} f(\xi).$$

Bu bileşimden  $\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha$  çarpımına giden bir  $h$  gömmesini tanımlayacağız. Seçim Aksiyomu sayesinde  $\bigcup\{\aleph_\alpha : \xi < \aleph_{\alpha+1}\}$  kümesi iyi sıralanabilir. Bu sıralamaya göre  $\delta < \aleph_{\alpha+1}$  ise  ${}^\delta\aleph_\alpha$  kümesinin en küçük gömmesi,  $g_\delta$  olsun. O zaman  $\gamma < \text{sup}(f[\beta])$  ise

$$\delta = \min\{z \in \beta : \gamma < f(z)\}, \quad h(\gamma) = (g_\beta(\delta), g_\delta(\gamma))$$

olsun. Böylece

$$\text{kard}(\text{sup}(f[\beta])) \leq \text{kard}(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha) = \aleph_\alpha,$$

dolayısıyla  $\text{sup}(f[\beta]) < \aleph_{\alpha+1}$ . Sonuç olarak  $\text{kf}(\aleph_{\alpha+1}) = \aleph_{\alpha+1}$ .  $\square$

### 5.9.2 Hesapmalar

**Teorem 109.**  $2 \leq \kappa, 1 \leq \lambda$ , ve  $\aleph_0 \leq \text{maks}(\kappa, \lambda)$  olsun. O zaman

$$\begin{aligned} \lambda \geq \text{kf}(\kappa) &\Rightarrow \kappa < \kappa^\lambda, \\ \text{GKH} \wedge \lambda < \text{kf}(\kappa) &\Rightarrow \kappa = \kappa^\lambda. \end{aligned}$$

*Kanıt.*  $\text{kf}(\kappa) \leq \lambda$  ise  ${}^\lambda\kappa$  kümesinin

$$\kappa = \bigcup_{\xi < \lambda} f(\xi)$$

sağlayan bir  $f$  elemanı vardır. Şimdi  $\xi \mapsto g_\xi : \kappa \rightarrow {}^\lambda\kappa$  olsun. O zaman  ${}^\lambda\kappa$  kümesinin  $\{g_\xi : \xi < \kappa\}$  kümesinde olmayan bir

$$\eta \mapsto \min\left(\kappa \setminus \{g_\xi(\eta) : \xi < f(\eta)\}\right)$$

elemanı vardır.

Şimdi  $\lambda < \text{kf}(\kappa)$  olsun. O zaman 108 numaralı teoremin kanıtındaki gibi

$${}^\lambda\kappa = \bigcup_{\xi < \kappa} {}^\lambda\xi = \bigcup_{\lambda \leq \xi < \kappa} {}^\lambda\xi \leq \bigcup_{\lambda \leq \xi < \kappa} {}^\lambda \text{kard } \xi = \bigcup_{\substack{\lambda \leq \xi < \kappa \\ \xi \in \mathbf{KN}}} {}^\lambda\xi \leq \bigcup_{\substack{\lambda \leq \xi < \kappa \\ \xi \in \mathbf{KN}}} \xi^2.$$

Eğer GKH doğruysa  $\mu < \kappa \Rightarrow 2^\mu \leq \kappa$ , dolayısıyla  $\kappa^\lambda \leq \kappa$ .  $\square$

Şimdi, gösterdiklerimize göre, eğer  $\kappa + \lambda$  sonsuzsa, o zaman

$$\begin{aligned} 2 \leq \kappa \leq 2^\lambda &\Rightarrow \kappa^\lambda = 2^\lambda, \\ \text{kf}(\kappa) \leq \lambda \leq \kappa &\Rightarrow \kappa < \kappa^\lambda \leq 2^\kappa, \\ 1 \leq \lambda < \text{kf}(\kappa) &\Rightarrow \kappa \leq \kappa^\lambda \leq 2^\kappa. \end{aligned}$$

Ayrıca

$$\text{GKH} \Rightarrow \kappa^\lambda = \begin{cases} \lambda^+, & \text{eğer } 2 \leq \kappa < \lambda \text{ ise,} \\ \kappa^+, & \text{eğer } \text{kf}(\kappa) \leq \lambda \leq \kappa \text{ ise,} \\ \kappa, & \text{eğer } 1 \leq \lambda < \text{kf}(\kappa) \text{ ise.} \end{cases}$$

Özel olarak

$$\text{GKH} \Rightarrow \aleph_\alpha^{\aleph_\beta} = \begin{cases} \aleph_{\beta+1}, & \text{eğer } \alpha < \beta \text{ ise,} \\ \aleph_{\alpha+1}, & \text{eğer } \text{kf}(\alpha) \leq \aleph_\beta \leq \aleph_\alpha \text{ ise,} \\ \aleph_\alpha, & \text{eğer } \aleph_\beta < \text{kf}(\alpha) \text{ ise.} \end{cases}$$

Şimdi

$$\begin{aligned} \beth_0 &= \omega, \\ \beth_{\alpha+1} &= 2^{\beth_\alpha}, \\ \beta \text{ limit} &\Rightarrow \beth_\beta = \sup\{\beth_\xi : \xi < \beta\} \end{aligned}$$

olsun. (Burada  $\beth$ , İbranice *beth* harfidir.)

**Teorem 110.** *Tüm  $\kappa$  ve  $\lambda$  için*

$$\begin{aligned} 1 \leq \lambda \leq \beth_\alpha &\Rightarrow \beth_{\alpha+1}^\lambda = \beth_{\alpha+1}, \\ 2 \leq \kappa \leq \beth_{\alpha+1} &\Rightarrow \kappa^{\beth_\alpha} \leq \beth_{\alpha+1}. \end{aligned}$$

*Alıştırma 57.* Teoremi kanıtlayın.

**Teorem 111.** *GKH doğrudur ancak ve ancak her  $\alpha$  ordinali için*

$$\aleph_\alpha = \beth_\alpha.$$

*Alıştırma 58.* Teoremi kanıtlayın.

## Kaynakça

- [1] I. M. Bocheński. *A history of formal logic*. Translated and edited by Ivo Thomas. University of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind., 1961.
- [2] George Boolos. Iteration again (1989). In *Logic, Logic, and Logic*, pages 88–104. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1998. With introductions and an afterword by John P. Burgess, With a preface by Burgess and Richard Jeffrey, Edited by Jeffrey.
- [3] Cesare Burali-Forti. A question on transfinite numbers (1897). In van Heijenoort [25], pages 104–12.
- [4] Georg Cantor. Letter to Dedekind (1899). In van Heijenoort [25], pages 113–7.
- [5] Paul J. Cohen. *Set theory and the continuum hypothesis*. W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1966.
- [6] Richard Dedekind. *Essays on the theory of numbers. I: Continuity and irrational numbers. II: The nature and meaning of numbers*. authorized translation by Wooster Woodruff Beman. Dover Publications Inc., New York, 1963.
- [7] Descartes. *The Geometry of René Descartes*. Dover Publications, Inc., New York, 1954. Translated from the French and Latin by David Eugene Smith and Marcia L. Latham, with a facsimile of the first edition of 1637.
- [8] Carl Friedrich Gauss. *Disquisitiones Arithmeticae*. Springer-Verlag, New York, 1986. Translated into English by Arthur A. Clarke, revised by William C. Waterhouse.
- [9] Kurt Gödel. The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum-hypothesis. *Proceedings of the National Academy*

- of Sciences of the United States of America, 24(12):556–557, December 1938.
- [10] Kurt Gödel. Consistency-proof for the generalized continuum-hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 15(4):220–224, April 1939.
- [11] Kurt Gödel. On formally undecidable propositions of *principia mathematica* and related systems I (1931). In van Heijenoort [25], pages 596–616.
- [12] Casimir Kuratowski. Sur la notion d'ordre dans la théorie des ensembles. *Fundamenta Mathematicae*, pages 161–71, 1921.
- [13] Azriel Levy. *Basic set theory*. Dover Publications Inc., Mineola, NY, 2002. Reprint of the 1979 original [Springer, Berlin].
- [14] Geoffrey Lewis. *Turkish Grammar*. Oxford University Press, second edition, 2000. First edition 1967.
- [15] Ali Nesin. Aksiyomatik kümeler kuramı. <http://www.acikders.org.tr/>, 2010.
- [16] Ali Nesin. *Sezgisel Kümeler Kuramı*, volume 6 of *Nesin Matematik Köyü Kitaplığı*. Nesin Yayıncılık, İstanbul, 2010.
- [17] Giuseppe Peano. The principles of arithmetic, presented by a new method (1889). In van Heijenoort [25], pages 83–97.
- [18] David Pierce. Induction and recursion. *The De Morgan Journal*, 2(1):99–125, 2012. <http://education.lms.ac.uk/2012/04/david-pierce-induction-and-recursion/>.
- [19] Atilla Özkırmılı. *Türk Dili, Dil ve Anlatım: Yaşayan Türkçe Üzerine Bir Deneme*. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001.
- [20] Bertrand Russell. Letter to Frege (1902). In van Heijenoort [25], pages 124–5.
- [21] Waclaw Sierpiński. L'hypothèse généralisée du continu et l'axiome du choix. *Fund. Math.*, 34:1–5, 1947.
- [22] Thoralf Skolem. Some remarks on axiomatized set theory (1922). In van Heijenoort [25], pages 290–301.

- [23] Alfred Tarski. The concept of truth in formalized languages (1933). In *Logic, semantics, metamathematics*, pages 152–278. Hackett Publishing Co., Indianapolis, IN, second edition, 1983. Papers from 1923 to 1938, Translated by J. H. Woodger, Edited and with an introduction by John Corcoran.
- [24] Alfred Tarski and Steven Givant. *A formalization of set theory without variables*, volume 41 of *American Mathematical Society Colloquium Publications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1987.
- [25] Jean van Heijenoort, editor. *From Frege to Gödel: A source book in mathematical logic, 1879–1931*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2002.
- [26] John von Neumann. On the introduction of transfinite numbers (1923). In van Heijenoort [25], pages 346–354.
- [27] Norbert Wiener. A simplification of the logic of relations (1914). In van Heijenoort [25], pages 224–7.
- [28] Ernst Zermelo. Investigations in the foundations of set theory I (1908a). In van Heijenoort [25], pages 199–215.

# İşaretler

$\emptyset$	4
$x, y, z, \dots$	15
$a, b, c, \dots$	15
$=$	20
$A, B, C, \dots$	23
$A \cap B, A \cup B$	25
$\cap A, \cup A, \mathcal{P}(A)$	26
$\mathbf{V}$	27
$a'$	29
$0$	29
$\Omega$	29
$\omega$	31
$(a, b)$	33
$\check{R}$	34
$A \times B$	34
$\mathbf{ON}$	38
$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta, \iota$	39
$\xi$	39
$\alpha + \beta$	48
$\alpha \cdot \beta$	52
$\alpha^\beta$	55
$\beta_\alpha$	58
${}^b A$	58
$\text{der}(\alpha)$	59



$R/S$	63
$B \circ F$	63
$F^{-1}$	63
$a \approx b$	64
$\text{ord}(a, S)$	65
$\text{kard}(a)$	65
<b>KN</b>	65
$\kappa, \lambda, \mu, \nu$	65
$F: A \twoheadrightarrow B$	67
$F: A \mapsto B$	67
$a \preceq B$	67
$a \sqcup b$	69
$\text{exp}(\alpha, \beta)$	71
$\mathcal{P}_\omega(A)$	71
$a \prec B$	72
$\kappa^+$	76
$\aleph_\alpha$	76
$\kappa \oplus \lambda, \kappa \otimes \lambda$	77
$\mathbb{N}$	79
$\mathbb{Q}^+$	79
$\mathbb{R}^+$	80
<b>KH</b>	80
<b>GKH</b>	81
$\kappa^\lambda$	82
$\text{kf}(\alpha)$	84
$\beth_\alpha$	88

# Dizin

## A

aksiyom

- Ayırma A—u, 10, 13, 30
- Bileşim A—u, 8, 45
- Bitiştirme A—u, 4, 14, 28
- Boş Küme A—u, 4, 28
- Eşitlik A—u, 21
- Kuvvet Kümesi A—u, 10, 75
- mantıksal —, 22
- Peano A—ları, Dedekind–Peano  
A—ları, 33
- Seçim A—u, 9, 13
- Sonsuzluk A—u, 5, 13, 30
- Temel Kümeler A—u, 13
- Temellendirme A—u, 14
- Uzama A—u, 13, 22
- Yerleştirme A—u, 8, 14, 46
- Zermelo–Fraenkel A—ları, 13

altküme, 10

altsınıf, 10, 24

ardıl, 29, 35, 76

artan gönderme, 51

ayraç, 15

ayrık bileşim, 69

ayrılma, 16

## B

bağlayıcı, 15

bağıntı, 2, 34

denklik —sı, 11

ters —, 34

bileşim, 25

B— Aksiyomu, 8

bileşke, 63

birleşme, 16

boş küme, 4

boş sınıf, 27

büyüklük, 73

## C

Cantor

— normal biçimi, 59

—'un Teoremi, 74

Cantor normal biçimi, 7

Cantor'un Teoremi, 10

cümle, 7, 17

## Ç

çarpım, 34

## D

De Morgan Kuralları, 26

değer sınıfı, 35

değilleme, 16

değişken, 15

bağlantılı, 8

serbest, 7

denk, 19

—lik sınıfı, bağıntısı, 11

denklik, 16, 21

derece, 59

doğruluk, 17

doğrusal, 36

**E**

eleman, 1  
 eşitlik, 8, 21  
 eşleme, 9, 63  
 eşlenik, 9, 63  
 eşleşme, 2  
 evetleme, 16  
 evrensel sınıf, 8

**F**

fark, 25  
 formül, 7, 15

**G**

geçis, 16  
 geçişli, 32  
 genelleştirme, 16  
 gerektirme, 16  
 gömme, 67  
 gönderme, 35  
   ardıl —si, 35  
   birebir —, 67  
   injektif —, 67  
   özdeşlik —si, 35  
   sabit —, 35  
   ters —, 63  
 görüntü, 44

**İ**

içerilme, 21  
 içerme, 3  
 ikili, 11, 33  
 ilişki, 2  
 işlem, 40  
 iyi sıralama, 37  
 izomorf, 2

**K**

kapalı, 23

kapsama, 10  
 kardinal, 3, 9, 65  
 kesişim, 25  
 kofinallik, 84  
 Kontinü Hipotezi, 13, 80  
 küçük, 37  
 küme, 1, 3  
   — terimi, 23  
   boş —, 4

**L**

limit, 6, 39

**M**

mantıksal aksiyom, 22

**N**

niceleyici, 15  
 normal  
   — işlem, 51  
   Cantor — biçimi, 7, 59

**O**

ordinal, 3, 38, 65  
 limit, 39

**Ö**

öge, 1  
 örnekleme, 16  
 örten, 67  
 özdeşlik göndermesi, 35  
 özaynı tanımlı, 5, 40

**P**

paradoks  
   Burali-Forti P—u, 9, 38  
   Russell P—u, 7, 24

**R**

rakam, 56

rekürsif tanım, 5

## S

sabit, 15

— gönderme, 35

sağlamak, 23

sayı

gercel —lar, 12

kesirli —lar, 12

tam—ları, 2, 11

von Neumann doğal —ları,

5, 3<sup>1</sup>

sayılabilir, sayılamaz, 68

sınıf, 7, 23

— terimi, 23

boş —, 27

denklik —ı, 11

sınırlama, 46

sınırsız, 84

sonlu, sonsuz, 66

sıra, 1, 2

iyi —lama, 37

—lama, 1

—lı ikili, 11, 33

sıralama, 36

sürekli gönderme, 51

## T

taban, 56

tanım sınıfı, 35

tanımlama, 7, 23, 44

teorem

Burali-Forti Paradoksu, 9, 38

Cantor'un T—i, 10, 74

De Morgan Kuralları, 26

Fermat'ın T—i, 42

Gödel Eksiklik T—i, 9

Özyineleme T—i, 42, 46

Russell Paradoksu, 7, 24

Schröder–Bernstein T—i, 13

Tarski Doğruluğun Tanım-

lanamaması T—i, 9

Tümevarım T—i, 46

terim, 15

kapalı —, 23

küme —i, 23, 28

sınıf —i, 23, 27

ters, 34, 63

topluluk, 1

tutarlı, 14

tümel evetleme, 16

tümevarım, 31

tümleyen, 26

## V

von Neumann doğal sayıları, 5,

3<sup>1</sup>

## X

$x \mapsto F(x)$ , 35

## Y

yanlışlık, 17

yazılım, 56

Yerleştirme Aksiyomu, 8

yüklem, 15